

SPRAYGARD

ADJUVANT UNIVERSAL



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 2370/15.10.2008

CULTURA:

**TOATE
CULTURILE**

CONȚINE:

DI-I-P-MENTENE 400 G/L +
ALCOOL ETOXILAT

TIMP DE PAUZĂ:



4 SĂPTĂMÂNI

MOD DE ACȚIUNE:

ADJUVANT PELICULAR



FORMULARE:

SOLUȚIE APOASĂ



TERMEN DE VALABILITATE



RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Spraygard poate fi utilizat în toate culturile agricole, în amestec cu erbicide, fungicide, insecticide și regulatori de creștere, după cum urmează:

În amestec cu erbicide:

- **0.1 l/ha**, indiferent de cantitatea de soluție;
- reduce fenomenele de fitotoxicitate, în cazul erbicidelor mai puțin selective pentru cultură;
- protejează împotriva spălării de către ploile survenite după tratament;
- la aplicarea produselor pe bază de glifosat, se asigură o eficiență mai bună și îndelungată a tratamentului.

În amestec cu fungicide:

- **0.1 l/ha**, indiferent de cantitatea de soluție;
- reduce fenomenele de fitotoxicitate în situația utilizării unor fungicide sistemice la culturile de cereale păioase - aceste produse, în primăverile reci și ploioase, se translocă rapid, favorizând apariția unor efecte fitotoxice;
- prelungește efectul tratamentelor cu fungicide de contact, la diverse culturi și, în mod deosebit, la cultura de cartof;
- protejează împotriva spălării produsului de către ploile care cad la puțină vreme după efectuarea tratamentului.

Atenție! A nu se utiliza în amestec cu erbicidele în cultura de mazăre!



IMPORTANT

În amestec cu insecticide:

- **0.1 l/ha**, indiferent de cantitatea de soluție;
- extinde perioada de acțiune a produselor aplicate;
- împiedică spălarea de către ploii a produsului aplicat.

În amestec cu regulatori de creștere:

- **Spraygard** are efect penetrant și protector împotriva spălării;
- Determină absorbția mai bună a produsului în plantă, în condiții de temperaturi scăzute la momentul aplicării.
- Asigură protecție maximă împotriva spălării soluției de pe plante, în cazul culturilor irigate sau a ploilor intervenite la scurt timp de la aplicare (circa 30 minute după uscarea soluției pe plantă);
- Crește puterea de penetrare a substanțelor active;
- Îmbunătățește aderența pe suprafața plantei a produselor de uz fitosanitar (erbicide, fungicide, insecticide și regulatori de creștere cu care se utilizează în amestec), mărind eficacitatea tratamentelor și prelungind perioada de acțiune a produselor aplicate;
- Protejează împotriva degradării și volatilizării substanțelor active sub efectul razelor solare, când tratamentele se efectuează la temperaturi ridicate

Alte utilizări

- **La culturile de cereale: 0.4 l/ha** în 200 – **500 l/ha** apă, în stadiul GS 87 al dezvoltării culturii sau când umiditatea boabelor este în jur de 30%. Aplicarea adjuvantului Spraygard va avea ca efecte reducerea riscului de încolțire a boabelor în spic, menținerea indicelui Hargberg la valorile normale, dar și îmbunătățirea calității recoltei;
- **La culturile de legume, pomi și arbuști fructiferi, plante ornamentale, gazon** în situația acestor specii, Spraygard se poate folosi înainte de transplantare, pentru reducerea pierderilor de apă din plante sau imediat după transplantare. Se prepară o soluție de concentrație 2%, care poate fi administrată în două moduri: prin pulverizare directă pe plante sau, dacă acestea sunt mici, prin imersia lor în soluție;

ATENȚIE !!!

Nu se va aplica soluția pe rădăcinile plantelor. În cazul gazonului cultivat și care urmează să fie transplantat, se va aplica o cantitate de soluție de 450 l/ha (concentrație 2% Spraygard), cu 24 de ore înainte de decopertarea benzilor de gazon. Aplicarea se mai poate face și imediat după amplasarea gazonului la locul definitiv.

Important

Cu privire la compatibilitate: Spraygard poate fi utilizat în tank-mix cu produse de uz fitosanitar omologate, dar și cu oligoelemente (săruri de bor, oligoelemente chelatare, cupru, fier, magneziu, micronutrienți, sulf, etc.), respectând recomandările de utilizare ale acestora.

Pentru mai multă siguranță, se recomandă efectuarea unui test în prealabil.