

STABILAN 750 SL

REGULATOR DE CREȘTERE



Omologat în România cu Certificatul de omologare nr. 182PC/16.03.2016

CULTURA:
CEREALE

750

CONȚINE:

G/L CLORMEQUAT
CLORURĂ

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:
SISTEMIC



FORMULARE:
CONCENTRAT SOLUBIL
(SL)

TERMEN DE VALABILITATE



PESTE
10° ȘI
PÂNĂ
LA
25°C

MOD DE ACȚIUNE

Produsul **Stabilan 750 SL** este un regulator de creștere versatil, capabil să producă o gamă largă de modificări fiziologice la diferite specii și varietăți de plante. Se absoarbe rapid în plante într-un interval de 2-4 ore, în special în condiții de umiditate ridicată.

Stabilan 750 SL scurtează și întărește tulpina ceea ce determină prevenirea căderii plantelor.

Stabilanul 750 SL, aplicat la grâu, produce îngroșarea paiului și scurtarea internodiilor, prevenindu-se astfel căderea plantelor.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În România, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURA	DOZA DE APLICARE (L/HA)
GRÂU DE TOAMNĂ	1.8 - 2 L/ha, la soiurile de grâu predispuse la cădere 1.2 - 1.8 L/ha, la soiurile de grâu mai puțin predispuse la cădere Plantele de grâu în stadiul BBCH 30-31 (de la începutul alungirii tulpinii până la apariția primului nod)
GRÂU DE PRIMĂVARĂ	1.2 L/ha Plantele de grâu în stadiul BBCH 30-31 (de la începutul alungirii tulpinii până la apariția primului nod)
TRITICALE	1.5 - 2.0 L/ha Plantele de triticale în stadiul BBCH 31-32 (de la apariția primului nod, până la apariția celui de al doilea nod)



STABILAN® 750

CULTURA	DOZA DE APLICARE (L/HA)
GRÂU DE TOAMNĂ	1.8 - 2 L/ha , la soiurile de grâu predispuse la cădere 1.2 - 1.8 L/ha , la soiurile de grâu mai puțin predispuse la cădere Plantele de grâu în stadiul BBCH 30-31 (de la începutul alungirii tulpinii până la apariția primului nod)
GRÂU DE PRIMĂVARĂ	1.2 L/ha Plantele de grâu în stadiul BBCH 30-31 (de la începutul alungirii tulpinii până la apariția primului nod)
TRITICALE	1.5 - 2.0 L/ha Plantele de triticele în stadiul BBCH 31-32 (de la apariția primului nod, până la apariția celui de al doilea nod)
SECARĂ DE TOAMNĂ	1.5 - 2.0 L/ha Plantele de secară în stadiul BBCH 31-37 (de la apariția primului nod până la momentul în care este vizibilă frunza standard)
OVĂZ	1.5 L/ha Plantele de ovăz în stadiul BBCH31-35 (de la apariția primului nod până la cel de al cincilea nod)
RAPIȚĂ DE TOAMNĂ	0.5 - 0.75 L/ha Plantele de rapiță în stadiul BBCH 14-16 (fenofaza de 4-6 frunze ale rapiței)

TEHNICA DE APLICARE

Grâu de toamnă

Doza recomandată pentru o singură utilizare este de **1.8 - 2 l/ha** la soiurile predispuse la cădere și de **1.2 - 1.8 l/ha** la soiuri mai puțin predispuse la cădere. Doza mare se va folosi atunci când se întrunesc

condiții favorabile pentru căderea grâului.

Se pulverizează de la începutul fenofazei de alungire a tulpinii, până la momentul în care primul nod este vizibil, la o distanță de 1 cm de la punctul de înfrățire (BBCH 30-31). Plantele în această perioadă ar trebui să aibă o înălțime de 15-20 cm.

Grâu de primăvară

Doza recomandată pentru utilizare (o singură aplicare/cultură/sezon) este de **1.2 l/ha**. Se pulverizează de la începutul fenofazei de alungire a tulpinii, până la momentul în care primul nod este vizibil, la o distanță de 1 cm de la punctul de înfrățire (BBCH 30-31). Plantele în această perioadă ar trebui să aibă o înălțime de 15-20 cm.

Triticale (soiuri cu paiul lung)

Doza recomandată a se aplica este de **1.5-2.0 l/ha**. Doza maximă este de **2 l/ha**.

Doza maximă recomandată se va folosi în condiții favorabile pentru căderea triticalelor.

Se pulverizează de la începutul fenofazei de alungire a tulpinii când primul nod este de cel puțin 1 cm deasupra nodului de înfrățire și până când nodul 2 este de cel puțin 2 cm deasupra primului nod (BBCH 31-32).

Secară de toamnă

Doza recomandată a se aplica este de **1.5-2.0 l/ha**. Doza maximă recomandată se va folosi la aplicarea târzie.

Tratamentul se va aplica de la începutul fenofazei de alungire a tulpinii, până la momentul în care este vizibilă frunza standard (steag), dar nu este încă dezvoltată, când spicul începe



STABILAN® 750

să se umfle (BBCH 31-37).

Ovăz

Doza recomandată este de **1,5 l/ha**. Aplicarea tratamentului se va face de la apariția primului nod până la al cincilea (BBCH 31-35).

Rapiță de toamnă

Doza recomandată a se aplica este de **0,5 - 0,75 l/ha**. Aplicarea se va face în toamnă, în faza de 4-6 frunze ale rapiței.

IMPORTANT

NU utilizați substanța:

- Pe soluri sărace, cu conținut redus de azot
- Cu 3-4 ore înainte de ploaie sau de îngheț
- La temperatura aerului sub 10 ° C sau peste 25 ° C
- Când există vânt care poate duce substanța pe câmpurile învecinate
- Pe plante umede
- Pe culturi cu multe buruieni, în cazul în care nu au fost utilizate substanțe erbicide
- În timpul aplicării trebuie evitat ca substanța să ajungă pe câmpurile adiacente
- **Nu recomandăm în amestec cu niciun tip de îngrășământ foliar.**

AVANTAJE

- Reduce procentul de cădere al plantelor
- Crește eficiența plantei și scade consumul de apă
- Îmbunătățește consumul de substanțe nutritive

La rapiță

- Crește rezistența plantelor la iernare
- Se mărește sistemul radicular ceea ce îmbunătățește absorbția de apă și elemente nutritive
- Se recomandă aplicarea la soluri intens fertilizate cu azot

