

Fecha de versión: 01/10/2017

Versión: 00

CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

Concentrado Emulsionable (EC)

CLEMENTGROS® PLUS, es un fitorregulador (de efecto auxínico), absorbido por las hojas y traslocado hacia las raíces. **CLEMENTGROS® PLUS**, aplicado a partir del momento de la maduración, retarda la actividad enzimática favorecedora de la abscisión del fruto en Limones, Naranjos y Mandarinos, realizando en consecuencia, un efecto protector sobre la caída de éstos. También estimula el crecimiento de los tejidos del fruto, lo que permite aumentar la capacidad de desarrollo del mismo e incrementar el porcentaje de frutos de mayor tamaño, disminuyendo los calibres más pequeños (destrío). En Nogal mejora e incrementa el tamaño y peso del fruto.

COMPOSICION:

Diclorprop-P-2-etilhexilo*	p/v:
.....	3,7% p/v (37 g/l)
Cofomulantes c.s.p.....	100% p/v (1l)

**(R)*-2-(2,4-diclorofenoxi)propanoato de 2-etilhexilo (2,5 % p/v (25 g/l) de equivalente ácido de Diclorprop-P).

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero **N°4237**

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Lote N°:

Fecha de Vencimiento:

CONTENIDO NETO:

Fabricado por:

NUFARM S.A.S.

28 Boulevard Camélinat, 92230 Gennevilliers, Francia.

Importado y Distribuido por:

Nufarm Chile Ltda. Av. Las Condes #11380 Oficina 72, Vitacura. Santiago, Chile.



Grow a better tomorrow.

CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

Concentrado Emulsionable (EC)

2 de 7

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Diclorprop-P-2-etilhexilo pertenece al grupo químico de los ácidos fenoxicarboxílicos.

No fume, coma o beba durante el uso de este producto. Destine un equipo exclusivamente para aplicación de fitosanitarios. Si esto no fuera posible, después de la aplicación, lave bien el equipo antes de su uso para otros fines. Evite el contacto con la piel, ojos y ropas. **Durante la preparación** usar guantes impermeables, antiparras, overol impermeable y botas de goma. **En la aplicación** usar botas de goma, antiparras, overol impermeable y máscara con filtro para productos fitosanitarios. Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la niebla generada al pulverizar el producto. No aplique con viento. No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua. Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo. Lavarse prolijamente con agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño o después del trabajo. Conserve el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Resguarde el producto de las temperaturas elevadas(>60°) y de la luz directa del sol.

ECOTOXICOLOGIA: CLEMENTGROS® PLUS es moderadamente tóxico para peces y aves y virtualmente no tóxico para abejas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".

"REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES".

"NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD".

"NO INGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL".

"LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación de piel, ojos y mucosas, alergia o sensibilización de piel, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, mareos, somnolencia, depresión del sistema nervioso central.



Grow a better tomorrow.

CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

3 de 7

Concentrado Emulsionable (EC)

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona de la zona contaminada. Quítele la ropa manchada o salpicada.

Contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua limpia durante 20 minutos, en caso que el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave durante 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 20 minutos. Si la irritación persiste consultar a un oftalmólogo.

Contacto con la piel: lavar con abundante agua de la llave las partes afectadas. Retirar ropa y zapatos contaminados. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos.

Inhalación: Trasladar inmediatamente a un centro médico y/o conseguir ayuda médica y enséñele la etiqueta o el envase al facultativo.

Ingestión: No provocar el vómito. Trasladar inmediatamente a un centro médico y/o conseguir ayuda médica y enséñele la etiqueta o el envase al facultativo.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento Médico de Emergencia: El ingrediente activo de este producto pertenece al grupo químico ácido fenoxicarboxílicos. Además contiene un hidrocarburo aromático (riesgo de neumonitis química). Las medidas de tratamiento generales son: Despejar vías respiratorias. Evaluar realizar lavado gástrico, protegiendo las vías respiratorias. El carbón activado absorbe pobremente los hidrocarburos. Continuar tratamiento sintomático.

Teléfonos de emergencia: RITA_CHILE: (56 2) 2777 19 94. NUFARM CHILE: (56 2) 2215 94 66.

INSTRUCCIONES PARA EL TRIPLE LAVADO:

- 1- Vacíe el contenido del envase en el tanque de la pulverizadora y mantenga en posición de descarga por 30 segundos.
- 2- Adicione agua limpia al envase hasta $\frac{1}{4}$ de su capacidad.
- 3- Cierre el envase y agite durante 30 segundos.
- 4- Vierta el enjuague en el tanque de la pulverizadora y mantenga el envase en posición de descarga por 30 segundos. Realizar esta operación al menos tres veces.
- 5- Perfore el envase para evitar su reutilización.



Grow a better tomorrow.

CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

Concentrado Emulsionable (EC)

Instrucciones de Uso: CLEMENTGROS® PLUS, es un fitorregulador (de efecto auxínico), absorbido por las hojas y traslocado hacia las raíces. CLEMENTGROS® PLUS, aplicado a partir del momento de la maduración, retarda la actividad enzimática favorecedora de la abscisión del fruto en Limones, Naranjos y Mandarinos, realizando en consecuencia, un efecto protector sobre la caída de éstos. También estimula el crecimiento de los tejidos del fruto, lo que permite aumentar la capacidad de desarrollo del mismo e incrementar el porcentaje de frutos de mayor tamaño, disminuyendo los calibres más pequeños (destrío). En Nogal mejora e incrementa el tamaño y peso del fruto.

Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Dosis (cc/100L agua)	Dosis (ppm)	Observaciones
Mandarinos	200	50	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 14mm. Con una alta carga frutal. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Limoneros	200 - 400 (*)	50	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 21mm. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Naranjos	200 - 400 (*)	50-100	Aplicar con el 85% de los frutos con un diámetro ecuatorial sobre 21mm. Aplicar con un volumen de agua de 1500 - 2000 L/ha.
Nogal	300	75	Aplicar cuando el 10% de las flores femeninas se encuentran receptivas. Aplicar con volumen de agua de 2000 L/ha.

(*) Utilizar la dosis mayor para frutos de calibre pequeño.



CLEMENTGROS® PLUS

Fitorregulador

5 de 7

Concentrado Emulsionable (EC)

Preparación de la mezcla: Mezclar la cantidad necesaria de **CLEMENTGROS® PLUS** con el volumen de agua requerido, dentro del estanque limpio y vacío, manteniendo siempre el sistema de agitación funcionando.

Época de aplicación: En caso de ser necesario, regar preferentemente antes de aplicar el producto. Evitar temperaturas superiores a los 30°C durante la aplicación y evitar la deriva hacia cultivos colindantes. Mojar hasta punto de escurrimiento.

Compatibilidad: **CLEMENTGROS® PLUS** es compatible con un gran rango de plaguicidas, combinable con un gran número de fungicidas comunes.

Incompatibilidad: **CLEMENTGROS® PLUS** no presenta incompatibilidad manifiesta con otros productos, fitosanitarios y/o fertilizantes. El producto es incompatible y comienza a dar reacciones de descomposición en presencia de soluciones oxidantes y ácidos fuertes.

Fitotoxicidad: No produce ninguna fitotoxicidad cuando se emplea las dosis indicadas en la etiqueta.

Período de Carencia: 45 días. Para Nogal NC=No Corresponde.

Tiempo de reingreso al área tratada: Ingresar al área tratada 24 horas después de realizada la aplicación. Para animales no corresponde indicar tiempo de ingreso ya que el producto no es usado en aplicaciones a cultivos destinados a la alimentación de éstos.

Nota al comprador: El fabricante garantiza la óptima calidad del producto y su efectividad, cuando se utiliza de acuerdo a la recomendación. Sin embargo, éste no se responsabiliza por fallas, daños y perjuicios que pudiera ocasionar su inadecuado uso.



Grow a better tomorrow.