



NUFARM MCPA 750

Bekämpningsmedel klass 2L Reg nr 3236 Ogräsmedel endast för yrkesmässigt bruk

Preparatet är flytande och innehåller 750 g (77,8 % w/w) MCPA per liter (i form av 919 g/l MCPA dimetylaminsalt).

ANVÄNDNINGSMÅRADE

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, rågvete, korn och havre.

Utvidgat produktgodkännande för följande mindre användningsområden:

Mot örtogräs i odlingar av lin.

Mot örtogräs i odlingar av rödklöverfrö.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits som utvidgat användningsområde.

Karenstider:

Senaste användningstidpunkten är DC39 (flaggbladet fullt utvecklat), för detaljerad information om olika grödor läs medföljande bruksanvisning.

H302
H318
EUH401
P280
P305 + P351 + P338

Skadligt vid förtäring
Orsakar allvarliga ögonskador

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

P310

SP1

Första hjälpen:

P264

P270

P301 + P312

Tvätta händerna grundligt efter användning.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

VID FÖRTÄRING: vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av „Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom“.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.

Vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas

För mer information, läs medföljande anvisningar.

Övriga upplysningar:

Tillverkningsdatum: se förpackningen

Batchnummer: se förpackningen

Nödtelefonnummer: 112 (Begär Giftinformation)

+43 732 6914 2446 (Produktionsanläggning)



FARA



Nettovolym

10 L

510001529

Tillverkare/innehavare av godkännandet:

Nufarm Deutschland GmbH

Im Media Park 4e

50670 Köln

Tyskland

Tel:+492211791790

 **Nufarm**

Grow a better tomorrow

Bruksanvisning

Preparatbeskrivning:

Nufarm MCPA vekar systemetik och tas upp av ogrärens gröna delar. Preparatet transporteras ut till växten tillväxtpunkter, där det påverkar ogrärens hormonbalans.

Användningsvillkor:

Vid påfyllning av lantbrukspruta:

Påfyllning av lantbrukspruta får endast ske med hjälp av särskild anordning, såsom preparatpåfyllare eller sugspjut.

Vid användning av Nufarm MCPA 750:

Använd den personliga skyddsutrustning som framgår av denna etikett.

Vid spridning:

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda" för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iaktas.

Hjälpredan beställs på info@distributionservice.se, beställningsnummer 42132.

Rekommendationer:

Gröda	Ogräs	Dos (l/ha)	Behandlings-tidpunkt
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs	1,0 liter	BBCB 30-39*
Vårvete, vårkorn och havre	Mot ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs	1,0 liter	BBCB 23-39*
Höststråsad med insädd av rödklöver och/eller gräs	Mot ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs	0,6 liter	BBCB 30-31*
Vårstråsad med insädd av rödklöver och/eller gräs	Mot ett- och fleråriga örtogräs inklusive rotogräs	0,6 liter	BBCB 23-31*

*) Maximalt en behandling / säsong.

Inga övriga användningsområde finns registrerade.

Optimala verkingsförhållande

Rekommenderad vattenmängd: Använd 200 - 300 l vatten/ha. Vid sena sprutningar och låga bestånd använd 300-400 liter per hektar.

Klimat vid behandling: Behandla när ogräset är i god tillväxt, optimal lufttemperatur för Nufarm MCPA 750 är mellan 12-20 grader. Undvik behandlingar om det är risk för regn 1-2 timmar efter behandling eller vid risk för nattfrost.

Spridningsteknik: Sprutan ska vara funktionstestad och rätt kalibrerad, hastigheten ska anpassas så att stabil gång av bommen erhålls. Vindavdrift kan ge upphov till skada på annan växtlighet. Sprutvåskan ska fördelas jämnt och ge en god täckning på ogräsplantorna. Nufarm rekommenderar spaltspridare som ger medium till fin droppstorlek och en vätskemängd på 200-300 liter. För information om lämpligt munstycke kontakta din maskinhandlare.

Utvidgat produktgodkännande för följande mindre användningsområden:

Mot örtogräs i odlingar av rödklöver.

Mot örtogräs i odlingar av lin

Rödklöver till utsäde

1. Maxdos: 500 mL Nufarm MCPA 750/ha och behandling (vilket motsvarar 375 g/ha MCPA per hektar). Vid spridning av produkten ska 150-400 liter vatten per ha användas.

2. Högst 1 behandling per år.

3. Bomspruta

4. Behandlingstidpunkt: Fröåret, vid begynnande sträckning. Endast vårbehandling

Lin

1. Maxdos: 200 mL Nufarm MCPA 750/ha och behandling (vilket motsvarar 150 g/ha MCPA per hektar). Vid spridning av produkten ska 150-400 liter vatten per ha användas.

2. Högst 1 behandling per år.

3. Bomspruta

4. Behandlingstidpunkt: När linet är 5-8 cm högt

Personligt skydd och säker hantering

Använd personlig skyddsutrustning såsom skyddsoverall förkläde av plast, skyddshandskar av nitril och skodon avsedda för växtskyddsarbete. Använd också skyddsglasögon, andningsskydd halvmask med partikelfilter DIN EN 149 FFP2 eller halvmask DIN 58 646 HM med partikelfilter P2 DIN EN 143 (färgvit),

Tvätta av skyddshandskarna innan de tas av. Ta av skyddskläder och tvätta händer och ansikte med tvål och vatten. För mer information om personlig säkerhetsutrustning läs "Säker bekämpning".

Restriktioner

Skyddsavstånd: För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska de anvisningar som framgår av "Hjälpreda" för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd följas. Hjälpredan beställs på info@distributionservice.se, beställningsnummer 42132".

Efterföljande gröda: Inga restriktioner.

Blandbarhet: Inga kända problem.

Tillredning av sprutvätska

Blanda inte till mer sprutvätska än vad som kommer att gå åt. Sprutan skall stå så att vattenmiljön inte kan förorenas. Stå på en biobädd, i fält eller på en betongplatta vars avrinning går till en behållare. Var försiktig vid hantering av öppnade förpackningar.

1. Fyll tanken till hälften av den beräknade totala mängden vatten som skall ätgå
2. Starta omrörningen
3. Skaka produkten omsorgsfullt innan förpackningen öppnas
4. Håll produkten i preparatpåfyllare eller använd sugspjut, undvik spill.
5. Skölj den tomma förpackning omsorgsfullt minst 3 gånger och håll sköljvattnet i tanken via preparatpåfyllaren eller motsvarande anordning.
6. Fyll på resterande mängd vatten

Behåll omrörningen på och spruta ut omedelbart efter påfyllningen

Resistensstrategi

För att reducera risken för utveckling av resistens med Nufarm MCPA 750 bör följande råd följas:

Använd rekommenderad dos i denna bruksanvisning

Behandla inte upprepade gånger med preparat ur gruppen fenoxisyror under samma säsong. Behövs det utföras upprepade behandlingar, använd preparat med annan verkningsmekanism.

Efter utförd blandning/behandling

Rengöring av sprutan och sprututrustning: Efter avslutad sprutning skall sprutan rengöras grundligt.

Bered aldrig mer sprutvätska än vad som går åt för behandling. Efter utförd behandling (sprutan helt tomt) sköljs hela sprutan med vatten. Spruta ut sköljvattnet på behandlad mark/gröda. Mer omsorgfull rengöring kan därefter utföras med alkalisk rengöringsmedel och vatten. Följ instruktioner på rengöringsmedlet. Rengöringsvattnet sprutas ut på det behandlade fältet på ett säkert sätt, var observant på omgivande miljö.

Överblivna preparatrestor och rester av sprutvätska/rengöring av förpackning: Bästa sättet att minimera preparatrestor är att noggrant beräkna hur mycket sprutvätska som går åt vid behandlingen. Tomma preparatförpackningar sköljs omsorgsfullt 3 gånger och sköljvattnet hålls i sprutan via preparatpåfyllare eller motsvarande utrustning. Sprutning och övrig sprututrustning rengörs i fält. All rengöringsvätska sprids ut i det behandlade fältet, var observant på omgivande miljö.

Tomma förpackningar: Återanvänd inte preparatförpackningarna. Rengjorda förpackningar lämnas till särskild avfallshantering. (P501) Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfalls-mottagare. Detaljer om rengöring av förpackning finns i stycket "**Tillredning av sprutvätska**".

För närmare besked om var förpackningar kan lämnas se, www.svepretur.se

Lagring:

Förvara produkt endast i originalförpackning. Förpackningarna skall förvaras i stängt, torrt, svalt och välventilerat godkänt förvaringsutrymme för växtskyddsmedel. Förvaringen skall ske otillgängligt för barn och husdjur. Livsmedel och foder får inte förvaras på samma ställe som Nufarm MCPA 750.

Hållbarhet: Minst 2 år i obruten förpackning från produktionsdatum.

Ansvarstagande

Informationen på denna etikett är utformad efter rådande kunskap för hantering och användning av produkten. Om produkten används i enlighet med bruksanvisningen skall produkten fungera enligt rekommendationerna.

Nufarm garanterar att produktens sammansättning är i överensstämmelse med det som anges på etiketten så länge som produkten förvaras i öppnad originalförpackning. Eftersom lagring och användning är utanför företagets kontroll, kan inte tillverkaren hållas ansvarig för direkta och indirekta konsekvenser orsakade av felaktig hantering och användning. Flera behandlingar av lokal karaktär kan påverka effekten t ex väderförhållanden, jordart, sortval, behandlings-tidpunkt, spridningsteknik, resistens, blandning med andra produkter. Under ogynnsamma omständigheter kan en eller flera av dessa betingelser påverka effekten av produkten och en skada på grödan kan då inte uteslutas. För sådana konsekvenser kan tillverkare och distributör ej hållas ansvariga.