



CARNADINE® 200



Säljs endast av Gullviks
www.gullviks.se



CARNADINE® 200

Nytt verktyg mot skadeinsekter på den svenska marknaden

Carnadine innehåller acetamiprid i en smidig flytande formulering (200 g/L) och erbjuder ett kraftfullt skydd mot en bred palett av skadeinsekter – oavsett deras utvecklingsstadium. Produkten ger en snabb och tydligt synlig knockdown-effekt, samtidigt som dess systemiska och translaminära verkan säkerställer en långtidseffekt som köper värdefull tid under säsongen.

Med sin flexibla användning och det faktum att Carnadine inte är klassat som bifarligt, får odlaren ett effektivt och samtidigt ansvarsfullt val för en tryggare och mer förutsägbar odlingssäsong.

Aktiva substanser	200 g/l Acetamiprid
Formulering	SL (Vattenlösligt koncentrat)
Användningsområden	Sockerbetor (även foderbetor samt rödbetor) i BBCH 20-49 Morötter i BBCH 20-39 Ärtor, bönor, åkerbönor i BBCH 40-71 Potatis i BBCH 40-79 Stråsäd i BBCH 30-69
Förpackningsstorlekar	12 × 1l, 4 × 5 l

Kort om produktet

- Brett effektspann och brett användningsområde – säker och flexibel lösning för flera situationer.
- Snabb knockdown-effekt kombinerat med långverkande skydd – 2-4 veckor efter behandling, vilket ger Carnadine en unik position i sin kategori.
- Smidig hantering för användaren - Carnadine formulering innebär en kortare påfyllningstid av sprutan och minskar risken för stopp i munstyckena. påfyllningstid och krångel i sprutan.
- Frihet att spruta när som helst – dag eller natt – Carnadine är inte skadligt för bin, vilket ger maximal flexibilitet i fält.
- Karenstid på 28 dagar



Rekommenderat användning

Användningsområde	Skadegörare	Max dos vid behandling l/ha
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	Mot bl.a. betfluga och betbladlus	0.25
Morötter	Mot bl.a. morotsfluga	0.25
Ärtor, bönor, åkerbönor	Mot bl.a. ärtvecklare och bönsmyg	0.25
Stråsäd	Mot bl.a. trips	0.20
Potatis, BBCH 40-79 Karens till skörd: 7 dagar	Mot bl.a. koloradoskalbagge	0.18

KORTA FRÅGOR OCH SVAR VID ANVÄNDNING AV CARNADINE

Vad händer om det börjar regna direkt efter behandlingen?

Carnadine är regnfast efter 2 timmar. Det innebär att regn som faller två timmar efter sprutning normalt inte påverkar effekten eller slutresultatet.

Hur mycket vatten bör jag använda vid behandling?

Carnadine tas effektivt upp av de behandlade växtdelarna och transporteras systemiskt vidare ut i plantan mot tillväxtpunkterna.

För bästa effekt i täta bestånd, eller när målet är att nå insekter som sitter längre ner i grödan, rekommenderas en högre vattenmängd för att säkerställa god nedträngning och optimalt upptag.

Rekommenderad vattenmängd är 200–600 L/ha. Den lägre vattenmängden kan användas i öppna eller lågväxande grödor.

Blandbarhet

Carnadine kan blandas med aktuella ogräs-, svamp- och mikronäringsmedel, vilket underlättar samkörning av behandlingar.



CARNADINE® 200

Säljs endast av Gullviks
www.gullviks.se

CARNADINE är registrerat varumärke för Nufarm
Läs alltid etiketten för användning
Nufarm är medlem i Svenskt Växtskydd