

Brugsanvisning til mindre anvendelse af ukrudtsmidlerne Xinca (347-21) og Maya (347-28) i purløg til frøproduktion

*Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i
plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)*

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning om mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen følges. Da SEGES P/S Plante og Miljø udarbejder og søger godkendelse og vejledning på brugerens vegne, kan SEGES P/S Plante og Miljø ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i henhold til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et plantebeskyttelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen om mindre anvendelse følges.

Vejledning til mindre anvendelse - eget ansvar

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Xınca (347-21) og Maya (347-28) til bekæmpelse af ukrudt i purløg til frøproduktion

Ukrudtsmiddel

- Må kun anvendes i purløg til frøproduktion
- Maks. 4 behandlinger pr. vækstsæson med max 0,25 L/ha pr behandling, samlet dosis må ikke overstige 0,95 l/ha
- Halm fra behandlet afgrøde må ikke fodres op
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand
- Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra § 3-områder, for at beskytte vilde planter

Advarsel

”Se [Xınca](#) eller [Maya](#) etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Xınca (347-21) og Maya (347-28) til bekæmpelse af ukrudt i purløg til frøproduktion

Skadegører

Bredbladet ukrudt i purløg til frø.

Dosering

Xınca / Maya	Dosis l/ha
Max. dosering pr. sprøjtning	0,25 Max 4 behandlinger pr vækstsæson
Max. dosering i alt pr. vækstsæson	0,95

Doseringerne skal altid tilpasses afgrødens udviklingstrin. Stressede afgrøder bør ikke behandles.

Sprøjtetidspunkt:

Midlerne udsprøjtes på ukrudtes kimbladstadiet.

Antal behandlinger

Maks. 4 behandling pr. vækstsæson.

Risiko for skade

Ved anvendelsen af Xınca og Maya i purløg til frø er det meget vigtigt at doseringen tilpasses afgrødens udviklingstrin. Tag kontakt til din frøavlskonsulent for at aftale strategi.

Dato: 1417. november 2016