

Brugsanvisning til mindre anvendelse af Xınca (347-21) og Maya (347-28) til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg

Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF)

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning

Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette godkendelse.

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar

Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre anvendelse følges. Grøn Plantebeskyttelse ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader eller svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges.

Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker tilfredsstillende i den pågældende afgrøde.

Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til Mindre anvendelse følges.

Anvendelsen i afgrøden sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.

Vejledning for Xinca (347-21) og Maya (347-28) til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg

Ukrudtsmiddel:

- Må kun anvendes i kepaløg, skalotteløg og hvidløg til bekæmpelse af ukrudt
- Ikke senere end 90 dage før høst
- Max 4 behandlinger pr. afgrøde
- Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

Advarsel:

”Se Xinca/Maya etiketten”.

Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.

Brugsanvisning for Xinca (347-21) og Maya (347-28) til bekæmpelse af ukrudt i kepaløg, skalotteløg og hvidløg

Skadegører: Ukrudt

Dosering:

Xinca/Maya	Dosis L/ha
Max dosering pr. sprøjtning	0,25
Max dosering i alt	0,95

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:

Xinca/Maya udsprøjtes i perioden fra løgenes 1. bladstadie (BBCH 11) til løgenes 6. bladstadie (BBCH 16). Xinca/Maya skal anvendes på ukrudtets kimbladstadie.

Antal behandlinger:

Max 4

Risiko for skade:

Xinca/Maya skal anvendes, når løgene er i god vækst. Der er relativ få erfaringer med Xinca/Maya i løg, og midlerne bør anvendes med forsigtighed i starten.

06. februar 2017