

CPC
SIPSE

ETIQUETTES ADHESIVES

Tél. : 01 69 80 68 01

15 rue Gutenberg - Z.I. de la Bulle

B. P. 17 - 91620 NOZAY

Acceptation du Bon à Graver : Ce Bon à Graver ne doit en aucun cas être modifié.

par mail à : bt@sipse.fr

ou par fax : 01 69 80 68 64

Ce produit remplace une étiquette existante oui ☐ non ☐ Réf ou code à détruire _____

1. Lire soigneusement le texte composé, vérifier l'orthographe, l'exactitude des mots et des numéros, etc.,...

2. Examiner la présentation générale de l'épreuve.

3. Vérifier la sélection des couleurs.

4. Approuver la forme de découpe oui ☐ non ☐

Nous vous rappelons :

- que toute modification du document initial (correction d'auteur) génèrera des frais supplémentaires.

- qu'en cas de non retour du présent Bon à Graver, les frais de conception seront facturés.

A NOTER : Se référer au numéro indiqué dans le cartouche pour contrôler sur un nuancier :

une impression couleur n'est jamais fidèle à un ton pantone.

ATTENTION!!!

RELECTURE IMPORTANTE

POUVEZ-VOUS
NOUS CONFIRMER
LES COULEURS
SVP

Autorização de venda nº 0480 concedida pela DGAV

AZBANY®

Suspensão concentrada com 250 g/L
ou 22,9 % (p/p) de azoxistrobina

Fungicida do grupo das estrobilurinas
para combater as doenças nas culturas
do pepino, meloeiro, courgette, tomateiro,
cenoura, cebola, alface, morangueiro,
pimenteiro, trigo, cevada e arroz.

1L

LOTE:

- ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
- PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
- ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÉUTICO LEIA O RÓTULO
- CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTI-VENENOS: 808 250 143
- ATENÇÃO: ESTE PRODUTO NÃO PODERÁ SER APLICADO POR VIA AÉREA

Detentor do registo:

Nufarm Portugal, Lda ■ Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.

1700-036 Lisboa ■ PORTUGAL ■ Tel.: 217 998 440 ■ www.nufarm.pt



Grow a better tomorrow.

Azbany® é um fungicida sistémico de largo espectro pertencente à família das estrobilurinas, possui actividade preventiva, curativa e anti-esporulante, mas é essencialmente preventivo. O Azbany® caracteriza-se por ter alguma penetração nas folhas, por mobilidade translaminar e por difusão lateral.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

| CULTURA | DOENÇAS | CONCENT. (ml/hl) | RECOMENDAÇÕES |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| Pepino Meloero | Mildio Oídio | | O Azbany® deverá ser aplicado preventivamente antes do aparecimento dos primeiros sintomas. A persistência biológica do produto é de 7-10 dias. |
| Courgette (aboborinha) | Oídio | 80 | Efectuar no máximo 3 tratamentos, por ciclo cultural, com este produto, ou com outro com o mesmo modo de acção (Qol). Cada aplicação deve alternar com 2 aplicações de fungicidas com diferente modo de acção. |
| Tomateiro | Oídio Alternariose Mildio | 100 | O Azbany® deverá ser aplicado preventivamente antes do aparecimento dos primeiros sintomas. O produto possui uma persistência biológica de 7-10 dias em cebola, alface, morangueiro e pimenteiro; 10-12 dias em tomateiro e 10-14 dias em cenoura. |
| Cenoura | Oídio Alternariose | | |
| Alface (ar livre) | Mildio Estenfiliose | | |
| Cebola | Mildio Estenfiliose | | |
| Morangueiro | Oídio | 80 | Efectuar no máximo, 2 tratamentos, com este produto, ou com outro com o mesmo modo de acção (Qol), em tomateiro (ar livre), cenoura, alface (ar livre), cebola, morangueiro, e pimenteiro, por ciclo cultural, e no conjunto das doenças. Em tomateiro (estufa) realizar no máximo 1 tratamento. |
| Pimenteiro | Oídio | | Cada aplicação deve alternar com 2 aplicações de fungicidas com diferente modo de acção. |
| Trigo | Septoriose | | Em trigo e cevada, as aplicações devem ser efectuadas após o aparecimento das doenças de forma a manter sãs as 2 folhas superiores. |
| Trigo Cevada | Ferrugem castanha Oídio | | Efectuar no máximo 1 tratamento por campanha com este produto, ou com outro com o mesmo modo de acção (Qol). |
| Cevada | Helminthosporiose | 0,8-1,0 L/ha | No combate à piriculariose aplicar apenas antes da emergência das primeiras panículas; no combate à helminthosporiose aplicar após o aparecimento dos primeiros sintomas. |
| Arroz | Piriculariose Helminthosporiose | | Efectuar no máximo 1 tratamento por campanha. |

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

O Azbany® poderá afectar algumas cultivares de macieira; deve evitar-se os arrastamentos de calda para pomares de macieira vizinhos e não utilizar o mesmo pulverizador.

Não é aconselhável a mistura de Azbany® com insecticidas ou acaricidas, com formulação de concentrado para emulsão em culturas de ar livre e todos os insecticidas ou acaricidas em culturas protegidas.

Não aplicar nas 3 semanas seguintes à transplantação.

Não aplicar o produto em viveiros de plantas.

O produto não deve ser aplicado nos locais onde comecem a verificar-se quebras de eficácia

www.nufarm.pt

após as aplicações do produto ou de outros produtos com o mesmo modo de acção. Para evitar o desenvolvimento de resistência, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha Qol mais do que 3 vezes em pepino, meloeiro e courgette (aboborinha); 2 vezes em tomateiro (ar livre), cenoura, alface (ar livre), cebola, morangueiro e pimenteiro; 1 vez em tomateiro (estufa), trigo, cevada e arroz.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogêneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogênea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Azbany®
Suspensão concentrada (SC) com 250 g/L ou 22,9 % (p/p) de azoxistrobina
Autorização e venda nº 0480 concedida pela DGAV

ATENÇÃO
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Recolher o produto derramado
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem, excepto nas aplicações em arrozais.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Intervalo de segurança - 3 dias em courgette (aboborinha), meloeiro, morangueiro, pepino, tomateiro e pimenteiro; 7 dias em alface ao ar livre (não aplicar em alface de estufa); 10 dias em cenoura e 14 dias em cebola; 28 dias em arroz; 35 dias em cevada e trigo.

Detentor do registo: Nufarm Portugal, Lda | Praça de Alvalade, 7-6º Esq.
1700-036 Lisboa | Portugal | t. 217 998 440 | www.nufarm.com

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorlita; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

® Marca registada NUFARM PORTUGAL, LDA.



LA VALIDATION DE LA COPY POSITION EST IMPERATIVE
POUR LA MISE EN PRODUCTION DE VOTRE COMMANDE.



Les couleurs de votre étiquette

decoupe

Yellow

PANTONE 7494 C

Cyan

Black

Magenta

PANTONE 348 C

Client : NUFARM

Code étiquette : 952314-1214

Format : 145X270mm

Réf film CPC Sipse : BAG1 NUF952314-1214.ap

Fait le : 12/01/15

BAG N° : 1