

# Calda Bordalesa Caffaro® 20

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Nocivo por inalação.
  - Provoca lesões oculares graves.
  - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
  - Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
  - Ler o rótulo antes da utilização.
  - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
  - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial
  - SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
  - Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos
  - Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização.
  - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
  - Ficha de segurança fornecida a pedido.
  - Não contaminar as águas com o produto ou com a sua embalagem.
  - Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
  - Manter afastado de metais.
  - Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
  - Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
  - Impedir o acesso de animais às áreas tratadas durante pelo menos 3 semanas.
  - Intervalo de segurança: 7 dias.
- Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, (CIAV), Tel.: 808 250 143

## PERIGO



Edição n° 20052015      ® marca registada da ISAGRO S.p.A.

### MODO DE AÇÃO

O produto é um fungicida cúprico, de superfície, com actividade preventiva. Inibe vários processos metabólicos actuando em diversos enzimas. Pertence ao grupo dos inibidores multi-sítio.

### UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

**Videira:** míldio – 1,25 – 2,0 kg/hl. Realizar os tratamentos de acordo com o Sistema de Avisos. Na falta deste, iniciar as aplicações no estado 7-8 folhas ou imediatamente após o aparecimento dos primeiros focos na região. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições climáticas favoreçam o desenvolvimento da doença. Nunca aplicar com tempo frio ou chuvoso.

**Pereira e Macieira:** pedrado – 1,25 – 2,5 kg/hl. Na pereira realizar um tratamento no estado de repouso vegetativo com a concentração mais elevada; ao aparecimento da ponta verde das folhas tratar ambas as fruteiras. Nunca aplicar após aparecimento da ponta verde das folhas (estado D). – cancro: 1,25 – 2,5 kg/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente ao início, meio e fim da queda das folhas.

REV 20150618

# Calda Bordalesa Caffaro® 20



Pó molhável contendo 20% (p/p) de cobre, sob a forma de sulfato de cobre e cálcio (mistura bordalesa) Fungicida cúprico indicado para o combate aos míldios da videira, batateira, tomateiro e citrinos, aos pedrados da macieira e pereira, ao cancro da macieira, à gafa da oliveira, à lepra do pessegueiro, à pinta negra e à gomose dos citrinos.

Autorização provisória de venda n° 3459 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Lote:

Conteúdo: **500 g**



**Pessegueiro:** lepra – 1,25 – 3,75 kg/hl. Realizar uma aplicação à queda das folhas usando a concentração mais elevada. Repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar após a rebentação do pessegueiro.

**Batateira e Tomateiro:** míldio – 1,25 – 2,5 kg/hl. Tratar sempre que o tempo decorra chuvoso. No caso do tomateiro, as aplicações deverão iniciar-se no viveiro e imediatamente após a transplantação quando o tempo decorra chuvoso.

**Citrinos:** Míldio e queimado ou pinta negra – 1,25 – 2,5 kg/hl. Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência, iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surgirem as primeiras chuvas. Normalmente são suficientes três aplicações: meados de Novembro, fins de Dezembro e princípios de Fevereiro. - Gomose – 10 kg/hl. Tratar no início da Primavera na zona necrosada depois de raspada e limpa. No combate à gomose dos citrinos o produto destina-se a ser aplicado, por pincelagem, sob a forma de pasta bordalesa.

**Oliveira:** Gafa – 1 – 2 kg/hl. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Repetir o tratamento passadas 3 semanas se as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da doença.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e húmido (míldio da videira).
- Nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas (macieira e pereira), nem após a rebentação do pessegueiro.
- Na aplicação efectuada ao entumescimento dos gomos do pessegueiro, usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

### PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar continuamente até obter uma pasta homogénea e sem grumos. Deitar esta pasta no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. **Evitar deixar a calda em repouso.**

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) a velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro e recepção Valorfito.

**Nota:** Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Distribuído por:

**NUFARM PORTUGAL Lda**  
Praça de Alvalade, 7-6º Esq  
1700-036 Lisboa  
Telef.: 217 998 440

Detentor do registo:

**ISAGRO S.p.A.**  
Centro Uffici San Siro  
Via Caldera 21 - 20153 Milano / Italy  
Tel.: +39 02 40901.276    www.isagro.com

B0000000