

Máxima eficácia em apenas uma aplicação



MOMENTO IDEAL DE APLICAÇÃO

O momento ideal de aplicação de Clementgros Plus é ao início da mudança de cor. Quando os frutos ainda têm a cor verde brilhante, ainda antes de apresentarem a cor laranja.

COMO APLICAR

ANTI-QUEDA DO FRUTO

Laranjeira: 60 a 100 mL/hL, aplicando no máximo 2 L/ha

PARA AUMENTAR O TAMANHO FINAL DO FRUTO Limoeiro: 200 mL/hL, aplicando no máximo 3 L/ha Laranjeira e Mandarina: 100 a 150 mL/hL, aplicando no

máximo 3 L/ha




Comparação da eficácia em função do momento da aplicação

Cultura: Laranja variedade POWELL Clementgros Plus: 100 mL/hL Momento de aplicação: A: Início da mudança de cor,

os frutos ainda apresentam a cor verde

B: 75% dos frutos com a cor laranja em alguma zona do fruto





Testemunha

Clementgros Plus modalidade B



Clementgros Plus modalidade A



Autorização de venda n.º 1210 concedida pela DGAV Concentrado para emulsão (EC) com 25 g/L de diclorprop-P na forma de éster 2-etilhexil Embalagem disponível: 5L

