

# Cuprocaffaro® WG

FUNGICIDA CÚPRICO INDICADO PARA COMBATER O MÍLDIO DA VIDEIRA; OS PEDRADOS, A MONILIOSE E O CANCRO DA PEREIRA E DA MACIEIRA, A LEpra, O CRIVADO E A MONILIOSE DA AMEIXEIRA; A LEpra, O CRIVADO, A MONILIOSE E O CANCRO DA AMENDOEIRA E DA CEREJEIRA; A LEpra, O CRIVADO E A MONILIOSE DO PESSEGUEIRO; A MONILIOSE DO DAMASQUEIRO; A MONILIOSE E O CANCRO DA GINJEIRA; O MÍLDIO, A ALTERNARIOSE E O QUEIMADO OU PINTA NEGRA DOS CITRINOS; A GAFA, A CERCOSPORIOSE E O OLHO DE PAVÃO DA OLIVEIRA.



Grânulos dispersíveis em água com 37,5 % (p/p) de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre)

Autorização provisória de venda nº 3791 concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR OS RISCOS PARA SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE  
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

**Conteúdo : 20 Kg e**

Lote n.º



Um produto de:



## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

### ATENÇÃO



- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
- Ficha de Segurança fornecida a pedido.
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Ler o rótulo antes da utilização.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
- Evitar o contato com a pele e os olhos.
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.
- Intervalo de segurança – 7 dias em citrinos, oliveira e videira.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Tel.: 808 250 143

### MODO DE AÇÃO

O produto é um fungicida cúprico, de superfície, com actividade preventiva. Inibe vários processos metabólicos actuando em diversos enzimas. Pertence ao grupo dos inibidores multi-sítio.

### UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

**VIDEIRA: míldio:** 250 g/hl. Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos. Favorece o atempamento das varas.

**PEREIRA E MACIEIRA: pedrados e moniliose:** 450 - 600 g/hl. Realizar uma aplicação no estado de repouso vegetativo usando a concentração mais elevada. Este tratamento é desnecessário em macieira quando se pretenda combater unicamente o pedrado. Repetir ao aparecimento da ponta verde das folhas usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. **cancro:** 700 g/hl. Fazer 3 tratamentos



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num centro de recepção do sistema Valorfito.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Na cultivar "Golden Delicious" realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.

**AMEIXEIRA, AMENDOEIRA, CEREJEIRA, PESSEGUEIRO: lepra e crivado:** 300 - 600 g/hl. Realizar uma aplicação a queda das folhas usando a concentração mais elevada. Repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar este produto após a rebentação das árvores.

**AMEIXEIRA, AMENDOEIRA, CEREJEIRA, DAMASQUEIRO, GINJEIRA, PESSEGUEIRO: moniliose:** 450 g/hl. Realizar uma aplicação ao entumescimento dos gomos. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores. Se necessário prosseguir as aplicações com tirame.

**AMENDOEIRA, CEREJEIRA, GINJEIRA: cancro:** 800 g/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores.

**CITRINOS: míldio, alternariose e queimado ou pinta negra:** 250 g/hl. Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surgirem as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 3-4 semanas enquanto o tempo decorrer frio e húmido. Normalmente são suficientes 3 aplicações: meados de Novembro, fins de Dezembro e princípios de Fevereiro. As aplicações devem ser efectuadas pulverizando bem o tronco e as abas das árvores.

**OLIVEIRA: gafa, cercosporiose e olho de pavão:** 550 g/hl. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento passadas 3 semanas.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Se o produto for aplicado com tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade.
- Em pereira e macieira, nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. Na cultivar "Golden Delicious" realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.
- Em ameixeira, amendoeira, cerejeira, damasqueiro, ginjeira, pessegueiro nunca aplicar após rebentação; na aplicação efectuada ao entumescimento dos gomos, usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

### PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) a velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

© marca registada da ISAGRO SpA

Distribuidor:

**NUFARM PORTUGAL**

Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq  
1700-036 Lisboa - Tel: 217 998 440 Fax: 217 942 069

Um produto de:

**ISAGRO SPA:** Centro Uffici San Siro - Fabbriato D - Ala 3  
Via Caldera, 21 - I-20153 - Milano - Italia  
Tel: +39 02 40901 346 - Fax: +39 02 40901 320