



Suspensão concentrada com 385 g/L ou 31, 2 % (p/p) bromoxinil
(sob a forma de éster butírico)

Herbicida de contacto
para combate a
infestantes dicotiledóneas
na cultura do milho

1L
Lote: ver na
embalagem



Edição n.º 02

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV): 808 250 143

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Detentor do registo: Nufarm Portugal, Lda | Praça de Alvalade, 7-6º Esq.
1700-036 Lisboa | Portugal | t. 217 998 440 | www.nufarm.com



Grow a better tomorrow.

O **EMBLEM FLO** é um herbicida de contacto indicado para combater infestantes dicotiledóneas em aplicações de pós-emergência na cultura do milho.

CULTURAS, ÉPOCAS, DOSE E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Milho: Aplicar o herbicida em pós-emergência precoce da cultura (das 2 até às 5 folhas verdadeiras), na dose de 1,0 l/ha e com as infestantes no início do desenvolvimento vegetativo (tratar preferencialmente entre o estado de cotilédones até 2-3-6 folhas verdadeiras).

Infestantes susceptíveis:

Moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), breço (*Amaranthus blitoides*), tristes (*Amaranthus graecizans*), catassol (*Chenopodium album*), pé-de-ganso (*Chenopodium murale*), couve-maltesa (*Chenopodium opulifolium*), mal-casada (*Polygonum lapathifolium*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*) e erva-moira (*Solanum nigrum*).

Infestantes resistentes:

Gramíneas em geral, e cardo-das-vinhas (*Cirsium arvense*), corriola (*Convolvulus arvensis*), juncinha (*Cyperus esculentus*), junça (*Cyperus rotundus*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), beldroega (*Portulaca oleracea*), labaca-crespa (*Rumex crispus*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

■ Não atingir culturas vizinhas da área a tratar. ■ Em caso de acidente na cultura, poder-se-ão utilizar como culturas de substituição, apenas culturas cerealíferas. ■ Não aplicar o herbicida quando se verificarem temperaturas do ar inferiores a 16°C ou superiores a 25°C. ■ Não aplicar quando a cultura apresente sintomas de stress hídrico. ■ Não aplicar quando se prevejam chuvas nas 6 horas seguintes à aplicação. ■ A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas parcelas pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente susceptíveis. Para evitar que tal aconteça, recomenda-se proceder à rotação de culturas, sempre que possível, e a alternância de herbicidas com modo de acção diferente.

■ Não aplicar em mistura com adubos líquidos. ■ A absorção do produto é maior quando a temperatura do ar varia entre 16 e 25°C; por razões de eficácia, recomenda-se aplicar o herbicida dentro desta gama de temperaturas. ■ A aplicação com tempo excessivamente quente e seco favorece a manifestação de sintomas de fitotoxicidade.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar o pulverizador, calculando o volume de calda a utilizar por hectare, de modo a assegurar a distribuição uniforme. A quantidade de produto e o volume de água devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de arrastamento de calda, evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores.

Volume de calda aconselhado: 200 - 400 l/ha. Após o tratamento e depois de prévia remoção dos bicos e dos filtros que devem ser lavados separadamente, lavar o material de aplicação várias vezes com água e detergente.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

Nocivo por ingestão
Nocivo por inalação.
Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Suspeito de afetar o nascituro.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
Recolher o produto derramado.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de produtos perigosos.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem
Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície.
Para protecção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às zonas circunvizinhas.
Para protecção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m em relação às zonas circunvizinhas.
Intervalo de Segurança - 90 dias em milho.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

® Marca registada Nufarm S.A.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfit; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



5 600209 651932