

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTÓXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



Suspeito de afetar o nascituro.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Lavar as mãos cuidadosamente após o manuseamento

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Armazenar em local fechado à chave.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Intervalo de Segurança – 14 dias em videira; 21 dias em macieira e pereira.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.



IT0363-2-0315

MYSTICTM 25WG

Autorização provisória de venda nº 3999 concedida pela DGA

Grânulos dispersíveis em água contendo 25% (p/p) de tebuconazol

FUNGICIDA SISTÉMICO COM ACÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA

Indicado para combater o oídio da videira, o pedrado e o oídio da macieira e o pedrado e a estenfiliose da pereira

20x400g

LOTE:

Detentor do registo:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: 217 998 440
www.nufarm.pt

® Marca registada Nufarm S.A.S.



Grow a better tomorrow.

O **MYSTIC 25 WG** é um fungicida sistémico do grupo dos triazóis, inibidor da biossíntese dos esteróis, que actua na demetilação (DMI), com actividade preventiva e curativa.

O produto está indicado para combater o oídio da videira, o pedrado e o oídio da macieira e o pedrado e a estenfiliose da pereira.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO

Videira - Oídio - Usar 40 g/hl. Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência iniciar as aplicações a partir dos cachos visíveis. A persistência biológica do produto é de 12 a 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, **não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 3 vezes, posicionados antes do fecho dos cachos.** Os restantes tratamentos deverão ser realizados com fungicidas com outro modo de acção, como por exemplo, Cosan WDG.

Macieira - Pedrado: 30-40 g/hl; Seguir as recomendações do Serviço de Avisos. Na sua ausência efectuar os tratamentos a partir do aparecimento da ponta verde das folhas. **Oídio:** 40 g/hl; Efectuar o 1º tratamento ao abrolhamento dos gomos. O período de protecção para o oídio termina no fim do crescimento dos rebentos.

O produto tem uma persistência biológica de 10 a 12 dias, em função de maior ou menor pressão da doença.

Efectuar no máximo 4 aplicações anuais, por cultura e no conjunto das doenças visadas, com este ou outro fungicida com o mesmo modo de acção DMI.

Pereira - Pedrado: 30-40 g/hl; Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Na sua ausência efectuar os tratamentos a partir do aparecimento da ponta verde das folhas. O produto tem uma persistência biológica de 10 a 12 dias, em função de maior ou menor pressão da doença.

Estenfiliose: 75 g/hl; Efectuar aplicações preventivas, desde o vingamento até à colheita, sempre que se verifiquem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Alternar com fungicidas com outro modo de acção, como por exemplo, Tidora G.

Efectuar no máximo 4 aplicações anuais, por cultura e no conjunto das doenças visadas, com este ou outro fungicida com o mesmo modo de acção DMI.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar **MYSTIC 25 WG**, nos locais onde se comecem a verificar quebras de eficácia do produto, após aplicação repetida do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (DMI).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.