

MYSTIC® EW

Emulsão óleo em água (EW) contendo
25% (p/p) de tebuconazol

FUNGICIDA SISTÊMICO, COM ACÇÃO PREVENTIVA E CURATIVA

Indicado para combater doenças de trigo
e cevada e oídio e podridão na videira

- ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
- PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
- ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Detentor do registo:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7-6º Esq.
1700-036 LISBOA



1L
LOTE: VER
EMBALAGEM



Grow a better tomorrow.

MYSTIC®EW é um fungicida sistémico da família dos triazóis, inibidor da biossíntese dos esteróis, que actua na demetilação (DMI), com actividade preventiva e curativa para combater algumas doenças dos cereais e o oídio e podridão cinzenta da videira.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

■ **Videira (uva de mesa e para vinho):** oídio (*Uncinula necator*) e podridão cinzenta (*Botrytis cinerea*): 0,3 – 0,4 L/ha; Seguir as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência iniciar as aplicações a partir dos cachos visíveis e até ao fecho do cacho. **Realizar no máximo uma aplicação por ciclo cultural.**

■ **Trigo de inverno e primavera:** oídio (*Blumeria graminis*), ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*), ferrugem castanha (*Puccinia hordei*), septoriose (*Septoria nodorum*) e helmintosporiose (*Helminthosporium hordei*): 1 L/ha;

■ **Cevada de inverno e primavera:** oídio (*Blumeria graminis*), ferrugem castanha (*Puccinia recondita*), septoriose (*Septoria nodorum*) e helmintosporiose (*Helminthosporium hordei*): 1 L/ha;

O tratamento deverá ser efectuado ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença de modo a manter sãs as duas folhas superiores (bandeira) e as espigas. Em anos muito favoráveis ao desenvolvimento das doenças efectuar dois tratamentos a intervalos de 2-3 semanas entre o início do encanamento e o espigamento.

No caso de variedades mais sensíveis efectuar um segundo tratamento, na presença de sintomas, se as condições se mantiverem favoráveis. Em certas condições este produto pode provocar necroses difusas nas folhas dos cereais tratados, sem efeitos negativos na produtividade.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha DMI mais de 2 vezes, por campanha. Este produto não deverá ser usado em mistura com outros produtos.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com pouco de água e agitar bem até se obter uma pasta homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade de distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. Aplicações por via terrestre: 200-400 L/ha (cereais) e 400-1000 L/ha (vinha).

© Marca registada NUFARM S.A.S. 953489 - 0217

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

PERIGO

Provoca irritação cutânea.

Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Provoca lesões oculares graves

Suspeito de afetar o nascituro.

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Pedir instruções específicas antes da utilização.

Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

Evitar a libertação para o ambiente.

Usar luvas de protecção/roupa de protecção/protecção ocular/protecção facial.

SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. [Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.]

Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não-pulverizada de 20 m para cereais de inverno (aplicações no outono/inverno) e de 10 m para cereais de primavera e vinha (aplicações em primavera), em relação às águas de superfície.

Para protecção das plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 m para cereais e de 10 m para vinha, em relação às zonas circunvizinhas.

Depois da utilização do produto, lavar todo o vestuário de protecção.

Intervalo de Segurança – 35 dias em cevada e em trigo, 14 dias em videira.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Anti-Venenos, Telef.: 808 250 143



NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

