

# NANDO<sup>TM</sup> 500SC

Suspensão concentrada (SC) com  
500 g/L ou 40% (p/p) de fluaziname

1L

**FUNGICIDA DE SUPERFÍCIE PREVENTIVO**

**Indicado para combater o míldio da batateira.**

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O  
AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO.

**Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143**



LOTE: VER EMBALAGEM

® Marca registada Nufarm SAS



Grow a better tomorrow.

**NANDO 500 SC** é um fungicida de superfície, de largo espectro, possui actividade preventiva, inibe a germinação dos esporos e alguma actividade sobre a formação dos esporos, indicado para o combate ao míldio da batateira.

### UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO

**Míldio da batateira:** 30-40 ml/hl, em tratamentos preventivos. Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos ou, na sua ausência, quando as condições climáticas forem favoráveis ao aparecimento da doença. O produto confere uma protecção durante 7 a 10 dias, destinam-se os 7 dias ao período de maior crescimento activo da planta.

### MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

### MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

#### NANDO<sup>®</sup> 500 SC

Suspensão concentrada (SC) com 500 g/L ou 40 % (p/p) de fluaziname  
Autorização provisória de venda n.º 3981 concedida pela DGAV



#### ATENÇÃO

**Provoca irritação cutânea.**

**Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.**

**Suspeito de afectar o nascituro.**

**Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

**SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE:** lavar com sabonete e água abundantes.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis.

Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 10 metros em batateira.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Intervalo de segurança – 7 dias.

**Detentor do registo:** Nufarm Portugal, Lda | Praça de Alvalade, 7-6º Esq.  
1700-036 Lisboa | Portugal | t. 217 998 440 | [www.nufarm.com](http://www.nufarm.com)

**NOTA:** Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.