

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**



ATENÇÃO

Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.

Suspeito de provocar cancro.

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Não comer, beber ou fumar.

Usar o equipamento de proteção individual exigido.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Intervalo de segurança – 60 dias entre a aplicação do produto e a venda ou consumo da batata armazenada.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143

Durante a armazenagem manter o produto em lugar seco e fresco.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.



® - marca registada de AGRIPHAR SA



NEO-STOP®

Autorização de venda nº 0150 concedida pela DGAV

Pó polvilhável contendo 1% (p/p) de clorprofame

Regulador de crescimento que actua como anti-abrolhante para batata de consumo armazenada

1 Kg

Lote:

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Distribuído por:

Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, nº 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa - Portugal
t. 217 998 440

Um produto:

AGRIPHAR S.A.
Rue de Renory 26/2
B-4102 Ougrée – BÉLGICA
Tel.: +32 4 385 97 11
Fax: +32 4 385 97 49



Nufarm

Grow a better tomorrow.

UTILIZAÇÕES

O **NEO-STOP** é um anti-abrolhante indicado para evitar o grelamento da batata armazenada, destinada ao consumo em fresco ou para fins de transformação.

Inibe o desenvolvimento dos brotos, actuando como anti-meristemático, aumenta o tempo de conservação e reduz a perda de peso dos tubérculos.

DOSE, ÉPOCA E MODO DE APLICAÇÃO

Grandes quantidades de batata

Dose de aplicação:

1 kg de produto por 1000 kg de batata.

Pequenas quantidades de batata

Dose de aplicação:

100 g por 100 kg de batatas.

Época de aplicação

A aplicação do produto deve fazer-se com batata sã, seca, encascada e sem brotos, ou quando os primeiros brotos começam a apontar, mas nunca antes de 3-4 semanas após a colheita. Em batatas “greladas” (brotos desenvolvidos), os brotos serão previamente removidos antes da aplicação do produto.

Modo de aplicação

O **NEO-STOP** aplica-se por polvilhação, de modo a ficar uniformemente distribuído por toda a pilha de tubérculos. No chão do armazém coloca-se uma camada de palha bem seca, que se polvilha com o produto. Em seguida e sucessivamente, aplica-se sobre cada camada de batata com cerca de 20 cm de altura, sendo que, na última camada a aplicação será reforçada. A altura da pilha de armazenagem não deverá exceder 90 cm de altura. A aplicação do produto deve ser feita com uma torpilha ou enxofradeira vulgar.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não efectuar mais de um tratamento com este produto.
- O produto só deve ser aplicado em batata limpa, seca, madura e sã. Eliminar tubérculos podres ou danificados.
- Não utilizar em batata semente.
- Não armazenar batata de consumo e batata semente no mesmo local.
- Não utilizar caixas previamente tratadas com o produto para armazenar batata semente.
- Não armazenar batata semente, sementes ou outros materiais de multiplicação em locais em que o **NEO-STOP** foi ou será aplicado.
- De modo a evitar a contaminação de outros produtos agrícolas, limpar cuidadosamente armazéns e caixas que tenham contido batatas tratadas com este produto.