

PREV-B2

ABUDO CE

SOLUÇÃO CONCENTRADA
CONTENDO BORO-ETANOLAMINA EQUIVALENTE A 2.1% DE BORO (B)
SOLÚVEL EM ÁGUA

PRECAUÇÕES



XI IRRITANTE

- Irritante para os olhos. • Pode causar sensibilização em contato com a pele. • Manter fora do alcance das crianças. • Manter longe de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um médico. • Conservar unicamente na embalagem de origem.
- Não aplicar o produto a temperatura acima dos 30 °C.

MODO DE ACÇÃO

PREV-B2™ contém 2.1% de Boro (B), solúvel em água, um elemento essencial que favorece a floração e a formação da parede celular, o que permite obter plantas, flores e frutos mais vigorosos. Actua como corrector de carências de boro. As plantas regularmente tratadas com **PREV-B2** mostram um aspecto mais são.

FACILMENTE BIODEGRADÁVEL

COMPATIBILIDADES

Pode ser aplicado antes e durante o período de colheita.

Em caso de mistura com outro produto, aconselha-se a realizar previamente um teste de compatibilidade.

RÁPIDA ABSORÇÃO DO BORO
PELAS FOLHAS GRAÇAS A UMA
MELHOR DISTRIBUIÇÃO NA SUPERFÍCIE

DISTRIBUÍDO POR



PRAÇA DE ALVALADE, 6 - 5ºESQ.
1700-036 LISBOA • PORTUGAL
TEL.: 217 998 440
WWW.NUFARM.PT

FABRICANTE



FRANKLINSTRAAT 9 • 9285WT
BUI TENPOST • THE NETHERLANDS
TEL.: +31 51 15 49 349
WWW.OROAGRI.COM

CONTEÚDO

1L

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

CULTURAS

PREV-B2™ pode ser aplicado em todo o tipo de culturas, especialmente em hortícolas (tomate, pepino, pimento, beringela, alface, cenoura, morango, melão, alho, alho-francês, cebola), pomóideas, bananeira, prunóideas, vinha, olival e ornamentais.

DOSES RECOMENDADAS

Aplicar 400 ml/hl, para corrigir estados de carência.

Aplicar 200 ml/hl, quando misturar com insecticidas e fungicidas.

Atenção às recomendações dos produtores. Deverá ser usado apenas quando houver necessidade. Não exceder a dose recomendada, especialmente em relação à protecção do solo.

Assegure-se que a quantidade de calda aplicada permita uma boa cobertura da totalidade da superfície da cultura.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar 3/4 de água, juntar a quantidade necessária de **PREV-B2** e completar o volume de água agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar conforme necessário. Primeira aplicação 2-3 semanas após a plantação ou a partir do estádio de 3-5 folhas. Os melhores resultados de **PREV-B2** verificam-se em aplicações realizadas pela manhã ou à noite, aplicado de ambos os lados das folhas.