

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS,
ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**



PERIGO

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Provoca lesões oculares graves.
Nocivo por inalação.
Suspeito de provocar cancro.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
Ler o rótulo antes da utilização.
Pedir instruções específicas antes da utilização.
Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização.
Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
Usar o equipamento de proteção individual exigido.
SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Ficha de segurança fornecida a pedido.
Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro do grupo das fenilamidas mais que 2 vezes durante o ciclo cultural.
Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície.
Intervalo de segurança: 42 dias em videira de uvas para vinificação.
Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.
Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



Autorização provisória de venda nº 3834 concedida pela DGAV

**Grânulos dispersíveis em água com 3,75 % (p/p) de benalaxil-M
+ 48 % (p/p) de folpete**

Fungicida

200g

Lote:

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE

RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

ANTES DE USAR O PRODUTO FITOFARMACÊUTICO LEIA O RÓTULO

Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.

Edição 201505



O **STADIO F** é um fungicida sistémico, do grupo das fenilamidas, utilizado no combate ao míldio da videira, em uvas para vinificação. Tem uma acção preventiva, curativa e antiesporulante.

**UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES,
ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

Videira de uvas para vinificação

Míldio (*Plasmopara viticola*): 200 g/h ou 2 kg/ha. Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste, o produto deve ser usado preventivamente ou seja os tratamentos devem iniciar-se ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença, no período que decorre entre as 7 a 8 folhas e o bago grão de chumbo. A persistência do tratamento é de 12 a 14 dias. Utilizar a alto volume na concentração de 200 g/100 litros de água. A dose a utilizar em pleno desenvolvimento vegetativo deve ser de 2 kg/ha. **Não efetuar mais que 2 aplicações com este fungicida ou outro do grupo das fenilamidas.**

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha fenilamidas, mais de 2 vezes por ano.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entre linhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

UM PRODUTO:

ISAGRO Spa
Centro Uffici San Siro
Fabbricato D - Ala 3
Via Caldera, 21
I-20153 - Milano - Italia
Tel: +39 02 40901 276 Fax: +39 02 40901 287



DISTRIBUÍDO POR:

Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6ºEsq.
1700-036 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: 217 998 440
www.nufarm.pt

