

# vega boro



BORO ETANOLAMINA  
ADUBO CE


*Aumenta a produção das culturas*

Embalagens



Lote nº:

Data de  
Fabrico:



Responsável pela colocação  
no mercado:  
Nufarm Portugal, Lda  
Praça de Alvalade, 6-5º Esq.  
1700-036 Lisboa

Es un producto

**lignokel**  
GESTIÓN AGRONÓMICA

Pol. Ind. Sector 2  
C/ Fray Sebastián Ferrer Bañuls  
03780 Pego Alicante  
Tel./Fax: 966 402 024  
info@lignokel.com

## Composição

Elemento	p/p (%)	p/v (%)
Boro (B) solúvel em água	10 %	13,6 %
Equivalente a Borato (B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	32,1 %	---
pH: 7,5	Densidade: 1,36 g/cc	

## Indicações

Solução líquida altamente concentrada em boro na forma complexada, indicada para a prevenção e correção de estados de carência devido a deficiências ou desequilíbrios na assimilação deste micronutriente. **Vega boro** é um produto especialmente recomendado para aplicação foliar embora também possa ser utilizado por via fertirrega.

### Três razões para a Vega boro:

- 1.-**Apresenta uma maior rapidez de ação** na assimilação e na mobilidade do boro na planta.
- 2.-**Apresenta máxima eficácia** no controlo das doenças mais frequentes causadas pela deficiência ou desequilíbrios na assimilação de boro, assim como o coração oco na beterraba, etc..
- 3.-**Apresenta uma óptima solubilidade** proporcionando ao agricultor o máximo conforto no manuseamento do produto.

## Especial Oliveira. Doses e épocas de aplicação

Fazer de 2 a 4 tratamentos segundo necessidades de cultura.

Tratamento	Doses
Março/Abril	200-300 cc/100 l. água
Maio	200-300 cc/100 l. água
Outono	300-500 cc/100 l. água

## Cultura, dose e época de aplicação

Cultura	Tipo de carência	Uso foliar/Tratamentos
Em Geral	Débil	100-200 cc/hl/segundo necessidade
	Moderado	300-400 cc/hl/segundo necessidade
	Forte	500-600 cc/hl/segundo necessidade
Extensivos		4-6 l/ha
Videira		1-1,5 l/ha

## Advertências e Incompatibilidades

Recomenda-se não misturar Vega boro com outros produtos. Não usar com caldas oleosas e produtos derivados como mistura sulfocálcica, sulfato de manganês e sulfato de zinco. Em caso de dúvida, realizar um teste previamente. Utilizar somente em caso de reconhecida necessidade. Não ultrapassar as doses adequadas. Evitar temperaturas de armazenamento extremas. Armazenar num lugar fresco e seco.

**AGITAR ANTES DE USAR**  
**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**  
**MANTER LONGE DE ALIMENTOS, BEBIDAS E RAÇÕES**