



# ADMIRAL 10EC


## FICHA TÉCNICA

### REGULADOR DE CRESCIMENTO PARA O CONTROLO DE COCHONILHAS

Autorização de Venda nº **0257** concedida pela DGAV

#### Composição

- 100 g/l ou 10,9% (p/p) de piriproxifena
- Contém nafta de petróleo (petróleo) aromática pesada



#### Formulação

- Concentrado para emulsão

#### Modo de acção

- O ADMIRAL 10EC é um inseticida regulador de crescimento de insetos, atuando por contacto e ingestão. Interfere na metamorfose, como mimético da hormona juvenil.

#### Locais de Aplicação

- Olivais
- Pomares de Macieiras e Pereiras, Laranjeiras e Tangerineiras



## UTILIZAÇÕES E CONCENTRAÇÕES DE APLICAÇÃO

O ADMIRAL 10 EC deve ser aplicado na presença de ninfas do primeiro instar da primeira geração para que se consiga uma eficácia aceitável ao longo do ciclo cultural.

| CULTURA                   | PRAGA                                                                                                                                | CONCENTRAÇÃO     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Laranjeira e tangerineira | Cochonilha negra ( <i>Saissetia oleae</i> )                                                                                          | 25-50 ml / hl.   |
|                           | Cochonilha vírgula ( <i>Lepidosaphes beckii</i> )                                                                                    | 50 ml / hl.      |
|                           | Cochonilha pinta-vermelha ( <i>Aonidiella auranti</i> ) e cochonilha-da-raiz ou cochonilha parlatoria ( <i>Parlatoria pergande</i> ) | 50-75 ml / hl.   |
| Macieira                  | Cochonilha de S. José ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )                                                                         | 30-50 ml / hl.   |
| Pereira                   | Cochonilha de S. José ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )                                                                         | 37,5-50 ml / hl. |
| Oliveira                  | Cochonilha negra ( <i>Saissetia oleae</i> )                                                                                          | 25-30 ml / hl.   |

## UTILIZAÇÕES MENORES

A eficácia e eventual fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

| CULTURA   | PRAGA                                                         | CONCENTRAÇÃO                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Cerejeira | Cochonilha de São José ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) | 37,5-50 ml / hl.                         |
| Limoeiro  | Cochonilha pinta-vermelha ( <i>Aonidiella auranti</i> )       | 50-75 ml / hl.<br>ou 0,5 a 1,875 L / ha. |

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, efectuar no máximo uma aplicação por campanha, de forma precoce durante a primeira geração das cochonilhas. Em caso de



necessidade recomenda-se a alternância deste produto com insecticidas com diferentes modos de acção.

### **MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA**

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

### **MODO DE APLICAÇÃO**

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).


Em cerejeira o volume de calda é 600 L/ha; aplicar em pré-floração, ao aparecimento de ninfas do primeiro instar da primeira geração, realizando no máximo 1 aplicação por campanha.

Em limoeiro o volume de calda é de 1000 a 2500 L/ha.; aplicar à eclosão de ninfas da primeira geração, realizando no máximo 1 aplicação por campanha.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

### **PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**

1.



### **PERIGO**



- Ficha de Segurança fornecida a pedido.
- Provoca irritação cutânea.
- Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
- Não comer, beber ou fumar.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros em oliveira, 10 metros em cerejeira, macieira e pereira e 15 metros em citrinos.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
- EM CASO DE INGESTÃO: contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (808 250 143) ou um médico.
- NÃO provocar o vómito.
- Intervalo de Segurança: 28 dias em citrinos.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar por acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na Lei.

#### **Um produto:**

**KENOGARD, S.A.**



**Diputación, 279 - 08007 Barcelona (Espanha)**

**Tel. +34 934 881 270 - [www.kenogard.es](http://www.kenogard.es)**

**Distribuído por: Nufarm Portugal, Lda.**

Praça de Alvalade, 7 – 6º Esq.

1700-036 Lisboa