

ZIDORA AG®

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 76% (p/p) de zirame

Fungicida orgânico pertencente ao grupo dos ditiocarbamatos

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E
PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda nº 0242 concedida pela DGAV
UFI: 3N1N-HU4G-EX0Q-SSWW

INDICAÇÕES RELATIVAS À UTILIZAÇÃO DO PRODUTO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

Zidora AG é um fungicida de superfície com actividade preventiva, que actua na respiração dos fungos inibindo a germinação dos esporos.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

■ **Pereira e Macieira – Pedrado da pereira (*Venturia pirina*), pedrado da macieira (*Venturia inaequalis*): 300 g/hl** - Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste, iniciar os tratamentos ao aparecimento da ponta verde das folhas e repetir no estado de botão branco ou rosa, à queda das pétalas, ao vingamento dos frutos. Durante a floração, tratar só em cultivares em que esta se prolongue ou quando existam condições favoráveis à evolução da doença. A persistência biológica do produto é de 7-10 dias, em função da pressão da doença. Em macieira, realizar no máximo 4 tratamentos com este produto, até ao final da floração e não realizar mais aplicações com produtos que contenham ditiocarbamatos.

■ **Pereira – Estenfiliose (*Stemphylium vesicarium*): 300 g/hl** - Os tratamentos devem ser efectuados após o vingamento dos frutos em condições favoráveis à doença. Na cultura da pereira realizar no máximo 4 tratamentos com este fungicida, no conjunto das doenças (pedrado e estenfiliose) e não efectuar mais aplicações com produtos que contenham ditiocarbamatos. ■ **Pessegueiro, Nectarina e Amendoeira – lepra (*Taphrina deformans*), Ameixeira – Lepra (*Taphrina pruni*), Cerejeira e Ginjeira – Lepra (*Taphrina wiesneri*): 200 g/hl** - Tratar à queda das folhas, ao entumescimento dos gomos e imediatamente após a floração. Repetir sempre que o tempo decorra húmido e chuvoso, até ao vingamento dos frutos. ■ **Ameixeira, cerejeira, ginjeira, amendoeira, pessegueiro e damasqueiro – Crivado (*Wilsonomyces carpophylus*) 200 g/hl** - Realizar uma aplicação à queda das folhas, entumescimento dos gomos, ao início da floração, à queda das pétalas e ao vingamento dos frutos, devendo prosseguir os tratamentos em condições favoráveis à doença. ■ **Moniliose (*Monilia laxa* e *Monilia frutigena*) 200 g/hl** - Realizar 3 aplicações, no início da floração, à queda das pétalas e ao vingamento dos frutos. Realizar no máximo 3 tratamentos com este fungicida, por cultura e no conjunto das doenças (lepra, crivado e moniliose) e não realizar mais aplicações com produtos que contenham ditiocarbamatos. Nas culturas do damasqueiro e pessegueiro aplicar apenas até ao final da floração. ■ **Pessegueiro - Cancro (*Fusicoccum amygdali*): 200 g/hl** - Realizar os tratamentos no início, meio e fim da queda das folhas e repetir ao entumescimento dos gomos.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

■ Não usar em fruta destinada a transformação industrial. ■ Em macieira e pereira, este produto pode provocar sintomas de fitotoxicidade, especialmente em tratamentos pós florais. ■ Na cultura do pessegueiro na aplicação realizada ao entumescimento dos gomos, usar grandes volumes de calda mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

INCOMPATIBILIDADE

O **Zidora AG** não deve ser misturado com os produtos de reacção alcalina.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Titular da autorização de venda:

Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq. 1700-036 Lisboa
Telef.: 217 998 440 | www.nufarm.com/pt

® Marca registada Nufarm Portugal, Lda.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado.

UFI: 3N1N-HU4G-EX0Q-SSWW



5 600242 295865

510012405_052024

CONTÉM:

20Kg UN3077

DATA DE PRODUÇÃO E Nº DE LOTE:
VER EMBALAGEM



PERIGO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Intervalo de segurança: 21 dias em ameixeira, cerejeira e ginjeira; 60 dias em pereira e macieira; 150 dias em amendoeira. Aplicar até ao fim da floração em damasqueiro, macieira e pessegueiro.

N.º máximo de aplicações: 3 em ameixeira, amendoeira, cerejeira, damasqueiro, ginjeira e pessegueiro; 4 em macieira e pereira. Não efectuar mais aplicações com produtos que contenham outras substâncias activas do grupo dos ditiocarbamatos (metirame), autorizados para a cultura em causa.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

■ Nocivo por ingestão. ■ Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. ■ Provoca lesões oculares graves. ■ Pode afetar os órgãos, após exposição prolongada ou repetida. ■ Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ■ Não respirar as poeiras e a nuvem de pulverização. ■ Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. ■ Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial. ■ EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ■ SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. ■ SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. ■ Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ■ Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. ■ Recolher o produto derramado. ■ Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. ■ Ficha de segurança fornecida a pedido. ■ Manter afastado dos alimentos e bebidas incluindo os dos animais. ■ Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. ■ Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 30 metros em pomares de pomóideas e prunóideas. ■ Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objetos contaminados, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contate o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telefone nº 800 250 250.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

Nufarm