

Cobre Flow Caffaro®

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

Ler o rótulo antes da utilização.

Não respirar a nuvem de pulverização.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Intervalo de segurança – 7 dias.

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), Tel.: 800 250 250

ATENÇÃO



Edição: 20052015

® marca registada da ISAGRO S.p.A.

MODO DE AÇÃO

O produto é um fungicida cúprico, de superfície, com actividade preventiva. Inibe vários processos metabólicos actuando em diversos enzimas. Pertence ao grupo dos inibidores multi-sítio.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira: mildio: 350 ml/hl. Aplicar este produto apenas nos dois últimos tratamentos. Favorece o atempamento das varas.

Pereira, Macieira: pedrados e moniliose: 550 - 800 ml/hl. Realizar uma aplicação no estado de repouso vegetativo usando a concentração mais elevada. Este tratamento é desnecessário em macieira quando se pretenda combater unicamente o pedrado. Repetir ao aparecimento da ponta verde das folhas usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas.

Cancro ou néctria: 700 ml/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Na cultivar 'Golden Delicious' realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.

Ameixeira, Amendoeira, Cerejeira, Pessegueiro: lepra e crívado: 350 - 700 ml/hl. Realizar uma aplicação a queda das folhas usando a concentração mais elevada. Repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar este produto após a rebentação das árvores. Na aplicação feita ao entumescimento dos gomos no pessegueiro usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

Cobre Flow Caffaro®



SUSPENSÃO CONCENTRADA COM 377,5 g/L OU 25% (P/P) DE COBRE (SOB A FORMA DE OXICLÓRETO DE COBRE)

Fungicida cúprico azul indicado para combater as seguintes doenças:

mildio da videira; pedrados, moniliose e cancro da pereira e macieira; lepra, crívado e moniliose da ameixeira; lepra, crívado, moniliose da amendoeira e cerejeira; moniliose do damasqueiro; crívado e moniliose e cancro da ginjeira; lepra, crívado e moniliose do pessegueiro; mildio, alternariose e queimado ou ponta negra dos citrinos; gafa, cercosporiose e olho de pavão da oliveira.

Autorização provisória de venda n.º 3454 concedida pela DGAV

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Nº DE LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: VER EMBALAGEM

Conteúdo: **1L**



SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICADA POR CERTIQUALITY

Ameixeira, Amendoeira, Cerejeira, Damasqueiro, Ginjeira, Pessegueiro: moniliose: 550 ml/hl. Realizar uma aplicação ao entumescimento dos gomos. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores. Na aplicação feita ao entumescimento dos gomos no pessegueiro usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

Amendoeira, Cerejeira, Ginjeira: cancro: 840 ml/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores.

Citrinos: mildio, alternariose e queimado ou ponta negra: 350 ml/hl. Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surgirem as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 3-4 semanas enquanto o tempo decorrer frio e húmido. Normalmente são suficientes 3 aplicações: meados de Novembro, fins de Dezembro e princípios de Fevereiro. As aplicações devem ser efectuadas pulverizando bem o tronco e as abas das árvores.

Oliveira: gafa, cercosporiose e olho de pavão: 550 ml/hl. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento passadas 3 semanas.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Se o produto for aplicado por tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade. Em pereira e macieira, nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. Na cultivar 'Golden Delicious' realizar aplicações só durante o repouso vegetativo. Em ameixeira, amendoeira, cerejeira, damasqueiro, ginjeira, pessegueiro nunca aplicar após a rebentação; na aplicação efectuada ao entumescimento dos gomos, usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) a velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfit; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

NUFARM PORTUGAL LDA

Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq. 1700-036 Lisboa
Tel: 21 799 84 40 - www.nufarm.pt

UM PRODUTO DE

ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro - Via Caldera 12

20153 Milano / Italy - Tel.: +39 02 40901 276
www.isagro.com