AMALINE® FLOW

Suspensão concentrada (SC) com 266,6 g/L ou 19,1 % (p/p) de cobre (sob a forma de sulfato de cobre tribásico) + 40 g/L ou 2,85 % (p/p) de zoxamida



Fungicida contra o míldio da videira

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

CONTÉM:

10L

DATA DE PRODUÇÃO E Nº DE LOTE: VER EMBALAGEM

Autorização de venda **nº 0660** concedida pela DGAV
UFI: FK8G-KFCP-GEA2-VKC1

Titular da Autorização de Venda:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
Telef.: 217 998 440 www.nufarm.com/pt

O **AMALINE® FLOW** é um fungicida preventivo que associa de forma complementar a zoxamida e o sulfato de cobre tribásico para lutar contra o míldio da videira (oomicetas). A zoxamida, pertence ao grupo dos benzamidas, penetra rapidamente nas ceras cuticulares das folhas e dos cachos, actua fixando-se sobre as tubulinas, inibindo a multiplicação celular do fungo.
O cobre do sulfato de cobre tribásico é um fungicida multi-site que reforça e completa a acção da zoxamida na inibição da germinação dos esporos do míldio.
A absorção rápida da zoxamida nas ceras cuticulares e a formulação do sulfato de cobre tribásico tornam **AMALINE® FLOW** muito resistente à lixiviação.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira – Míldio (Plasmopara viticola): **2,5 - 2,8 L/ha**, em aplicações preventivas.
Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar o primeiro tratamento preferencialmente após o vingamento e até 28 dias antes da vindima (BBCH 71 até 86). A **persistência biológica** do produto é de 8-12 dias, sendo o intervalo mais curto usado em condições de maior risco (chuvas constantes, elevada pressão da doença).

INTERVALO DE SEGURANÇA: 28 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não se deve tratar durante a floração pois pode provocar fitotoxicidade. Realizar no máximo 3 aplicações por ano, com este produto ou com outro contendo zoxamida. Para evitar o desenvolvimento de resistências recomenda-se a alternância deste produto com fungicidas com diferentes modos de acção.

INCOMPATIBILIDADES

Não misturar **AMALINE® FLOW** com adubos foliares. Para as res- tantes misturas, realizar um teste de compatibilidade.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.
Evitar deixar a calda em repouso.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vege- tativo,adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



ATENÇÃO

- Nocivo por ingestão.
- Provoca irritação ocular grave.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Contém zoxamida e 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície, incluindo de coberto vegetal.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- Intervalo de reentrada (vinhas): 6 dias após a aplicação.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.
Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

510008990_102026

5 600209 651802

nufarm