Cobre Flow Caffaro®

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO



H410 Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH208 Contém 2,2',2''- (hexa-hidro-1,3,5-triazin -1,3,5-triil)trietanol. Pode provocar uma reação alérgica.
EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido
P261 Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P262 Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P391 Recolher o produto derramado.
P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
SP1 - Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas).
Spe3a - Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície
SPe1 - Para proteção dos organismos do solo, não aplicar mais de 4 Kg Cu/ha/ano com este produto ou qualquer outro que contenha cobre.
Spe3PT1 - Para proteção dos organismos do solo, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície
SPoPT2 - Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas.
SPoPT4 - O aplicador deverá usar: luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda; luvas, vestuário de proteção adequado e botas de borracha durante a aplicação do produto.
SPoPT5 - Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6 - Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

ARMAZENAMENTO: Manter em lugar seco, ventilado e protegido dos raios solares.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos – CIAV. Telef: 800 250 250.
UFI: A8N0-S0K6-400Q-5CGG

® marca registada da Gowan Crop Protection Limited

MODO DE AÇÃO

O produto é um fungicida cúprico, de superfície, com actividade preventiva. Inibe vários processos metabólicos actuando em diversos enzimas. Pertence ao grupo dos inibidores multi-sítio.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira: míldio: 350 ml/hl. Aplicar este produto apenas nos dois últimos tratamentos. Favorece o atempamento das varas.
Pereira, Macieira: pedrados e moniliose: 550 - 800 ml/hl. Realizar uma aplicação no estado de repouso vegetativo usando a concentração mais elevada. Este tratamento é desnecessário em macieira quando se pretenda combater unicamente o pedrado. Repetir ao aparecimento da ponta verde das folhas usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas.
Cancro ou néctria: 700 ml/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Na cultivar 'Golden Delicious' realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.
Ameixeira, Amendoeira, Cerejeira, Pessegueiro: lepra e crivado: 350 - 700 ml/hl. Realizar uma aplicação à queda das folhas usando a concentração mais elevada. Repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar este produto após a rebentação das árvores. Na aplicação feita ao entumescimento dos gomos no pessegueiro usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

Cobre Flow Caffaro®



SUSPENSÃO CONCENTRADA COM 377,5 g/L OU 25% (p/p) DE COBRE (SOB A FORMA DE OXICLORETO DE COBRE)

CONTÉM - 2,2',2''-(HEXA-HIDRO-1,3,5-TRIAZINA-1,3,5-TRIIL)TRIETANOL

Fungicida cúprico azul indicado para combater as seguintes doenças:
míldio da videira; pedrados, moniliose e cancro da pereira e macieira; lepra, crivado e moniliose da ameixeira; lepra, cri ado, moniliose da amendoeira e cerejeira; moniliose do damasqueiro; crivado e moniliose e cancro da ginjeira; lepra, crivado e moniliose do pessegueiro; míldio, alternariose e queimado ou pinta negra dos citrinos; gafa, cercosporiose e olho de pavão da oliveira.
Autorização provisória de venda n.º **3454** concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE
RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
ESTE PRODUTO PODE SER USADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO

Nº DE LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: VER EMBALAGEM

Conteúdo: **1L**

5 600242 295964

nufarm Gowan CROP PROTECTION LIMITED

Ameixeira, Amendoeira, Cerejeira, Damasqueiro, Ginjeira, Pessegueiro: moniliose: 550 ml/hl. Realizar uma aplicação ao entumescimento dos gomos. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores. Na aplicação feita ao entumescimento dos gomos no pessegueiro usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.
Amendoeira, Cerejeira, Ginjeira: cancro: 840 ml/hl. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores.
Citrinos: míldio, alternariose e queimado ou pinta negra: 350 ml/hl. Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surgirem as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 3-4 semanas enquanto o tempo decorrer frio e húmido. Normalmente são suficientes 3 aplicações: meados de Novembro, fins de Dezembro e princípios de Fevereiro. As aplicações devem ser efectuadas pulverizando bem o tronco e as abas das árvores.
Oliveira: gafa, cercosporiose e olho de pavão: 550 ml/hl. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento passadas 3 semanas.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 7 DIAS EM TODAS AS CULTURAS.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Se o produto for aplicado por tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade. Em pereira e macieira, nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. Na cultivar 'Golden Delicious' realizar aplicações só durante o repouso vegetativo. Em ameixeira, amendoeira, cerejeira, damasqueiro, ginjeira, pessegueiro nunca aplicar após a rebentação; na aplicação efectuada ao entumescimento dos gomos, usar grandes volumes de calda, mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) a velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação respeitando as doses indicadas.

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado. As águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
NUFARM PORTUGAL Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq. 1700-036 Lisboa
Tel: 21 799 84 40 - www.nufarm.com/pt

UM PRODUTO DE
GOWAN CROP PROTECTION LIMITED
Rothamsted Research Center, West Common, Harpenden, Hertfordshire, Reino Unido

91850-PT-COBF-LF-08-1026