Cuprocaffaro® WG

FUNGICIDA CÚPRICO INDICADO PARA COMBATER O MÍLDIO DA VIDEIRA; OS PEDRADOS, A MONILIOSE E O CANCRO DA PEREIRA E DA MACIEIRA, A LEPRA, O CRIVADO E A MONILIOSE DA AMEIXEIRA; A LEPRA, O CRIVADO, A MONILIOSE E O CANCRO DA AMENDOEIRA E DA CEREJEIRA; A LEPRA, O CRIVADO E A MONILIOSE DO PESSEGUEIRO; A MONILIOSE DO DAMASQUEIRO; A MONILIOSE E O CANCRO DA GINJEIRA; O MÍLDIO, A ALTERNARIOSE E O QUEIMADO OU PINTA NEGRA DOS CITRINOS; A GAFA, A CERCOSPORIOSE E O OLHO DE PAVÃO DA OLIVEIRA.



Grânulos dispersíveis em água com 37,5 % (p/p)
de cobre (sob a forma de oxicloreto de cobre)
Contém cloreto e tri-hidróxido de dicobre

Autorização provisória de venda **nº 3791** concedida pela DGAV

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR OS RISCOS PARA SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico

Conteúdo : 20 Kg ℮

Lote N.º: ver embalagem Data de produção: ver embalagem

Nufarm

Um produto de:
Gowan® CROP PROTECTION LIMITED

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

ATENÇÃO



H332	Nocivo por inalação
H410	Muito tóxico para organismos aquáticos com efeitos duradouros.
EUH210	Ficha de segurança fornecida a pedido.
P261	Evitar respirar a nuvem de pulverização.
P270	Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P304+P340	EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P391	Recolher o produto derramado.
P501a	Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
SP1	Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.
SPe1	Para proteção dos organismos do solo, não aplicar mais de 4 kg Cu/ha/ano com este produto ou qualquer outro que contenha cobre.
Spe3PT1	Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície
SPgPT1	Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.
SPgPT3	Este produto pode ser usado em Modo de Produção Biológico (a constar na face principal do rótulo, a negrito)
SPgPT4	Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
SPoPT4	O aplicador deverá usar: luvas adequadas e vestuário de proteção durante a preparação da calda e a aplicação do produto.
SPoPT5	Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento, às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
SPoPT6	Após o tratamento lavar bem o material de proteção tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

UFI AQE1-109A-E00R-QNJV

MODO DE AÇÃO

O produto é um fungicida cúprico, de superfície, com actividade preventiva. Inibe vários processos metabólicos actuando em diversos enzimas. Pertence ao grupo dos inibidores multi-sítio.

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

VIDEIRA: Míldio: 250 g/hl ou 2,5 kg/ha. Aplicar apenas nos dois últimos tratamentos. Favorece o atempamento das varas. Máximo 2 aplicações.

PEREIRA E MACIEIRA: Pedrados e Moniliose: 450 - 600 g/hl ou 4,5-6,0 kg/ha. Realizar uma aplicação no estado de repouso vegetativo usando a concentração mais elevada. Este tratamento é desnecessário em macieira quando se pretenda combater unicamente o pedrado. Repetir ao aparecimento da ponta verde das folhas usando a concentração mais baixa. Fazer 3 tratamentos respectivamente no início, meio e fim da queda das folhas.Nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. Máximo 2 aplicações. **Cancro:** 700 g/hl ou 7,0 kg/ha. Fazer 3 tratamentos respetivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Na cultivar "Golden Delicious" realizar aplicações só durante o repouso vegetativo. Máximo 3 aplicações.

AMEIXEIRA, AMENDOEIRA, CEREJEIRA E PESSEGUEIRO: Lepras e Crivado: 300 - 600 g/hl ou 3,0-6,0 kg/ha. Realizar uma aplicação a queda das folhas usando a concentração mais elevada. Repetir ao entumescimento dos gomos usando a concentração mais baixa. Nunca aplicar este produto após a rebentação das árvores. Máximo 2 aplicações.

AMEIXEIRA, AMENDOEIRA, CEREJEIRA, DAMASQUEIRO, GINJEIRA E PESSEGUEIRO: Monilioses: 450 g/hl ou 4,5 kg/ha. Realizar uma aplicação ao entumescimento dos gomos. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores. Máximo 1 aplicação.

AMENDOEIRA, CEREJEIRA, GINJEIRA: Cancro: 800 g/hl ou 8,0 kg/ha. Fazer 3 tratamentos respetivamente no início, meio e fim da queda das folhas. Não aplicar este produto após a rebentação das árvores. Máximo 3 aplicações.

CITRINOS (laranjeira doce, laranjeira amarga tangerineira, toranjeira, clementina, limoeiro e lima): Míldios, Alternariose e Queimado ou Pinta Negra: 250 g/hl ou 2,5 kg/ha. Iniciar os tratamentos no outono quando se verificar um abaixamento da temperatura e surgirem as primeiras chuvas fortes. Repetir a intervalos de 3-4 semanas enquanto o tempo decorrer frio e húmido. Normalmente são suficientes 3 aplicações: meados de novembro, fins de dezembro e princípios de fevereiro. As aplicações devem ser efetuadas pulverizando bem o tronco e as abas das árvores.

OLIVEIRA: Gafa, Cercosporiose e Olho de Pavão: 550 g/hl ou 5,5 kg/ha. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir o tratamento passadas 3 semanas. Máximo 2 aplicações.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 7 dias

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Se o produto for aplicado com tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade.
- Em pereira e macieira, nunca aplicar após o aparecimento da ponta verde das folhas. Na cultivar "Golden Delicious" realizar aplicações só durante o repouso vegetativo.
- Em ameixeira, amendoeira, cerejeira, damasqueiro, ginjeira, pessegueiro nunca aplicar após rebentação; na aplicação efectuada ao entumescimento dos gomos, usar grandes volumes de calda,mas evitar pulverizações a altas pressões para não destacar os gomos.

PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min) a velocidade e largura do trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.
A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por hectare, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose .

5 600242 295957

valorfito

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num centro de recepção do sistema Valorfito.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

® marca registada da Gowan Crop Protection Limited

Distribuidor:
NUFARM PORTUGAL
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq
1700-036 Lisboa - Tel: 217 998 440 - www.nufarm.pt
Um produto de:
Gowan Crop Protection Limited
Rothamsted Research, West Common, Harpenden, Hertfordshire, AL5 2JQ, Reino Unido

91841-PT-CUPF-LF-07-1124