DECA

Concentrado para emulsão (EC) com 25 g/L ou 2,5 % (p/p) de deltametrina
Contém: nafta (petróleo) aromática leve



Inseticida

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda **nº 0292** concedida pela DGAV

GTIN: 08904150047569
LOTE Nº: 68701
DATA PROD.: 05/2024

UFI: EHXW-F8VK-T00S-JP83

8 904150 047569

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E RESTANTES INFORMAÇÕES, VER INTERIOR.

DATA DE PRODUÇÃO E Nº DE LOTE: VER EMBALAGEM

Distribuído por:
Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
Telef.: 217 998 440
www.nufarm.com/pt

Titular da Autorização de Venda:
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA, S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th floor
30006 Murcia - España
Tel.: +34 868 127 589

CONTÉM:

5L

Nufarm

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

O **DECA** é um inseticida piretróide, de contacto e ingestão, que atua no sistema nervoso dos insetos como modulador dos canais de sódio (IRAC MoA sub-grupo 3A).

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Para as seguintes culturas, **só ao ar livre**, as **concentrações** indicadas referem-se a mililitros (ml) de **DECA** por hectolitro (hl) de água (ou seja, por cada 100 litros de água), sendo apresentadas, nalguns casos, as **doses máximas** (em ml de produto por ha): ▪ **Alface:** Contra a **áltica-da-vinha** *(Altica lythri)*, a **lagarta** *(Spodoptera littoralis)* e **lagartas** (Agrotis sp.) aplicar **30 ml/hl (300 ml/ha)**. Contra o **afídeo-da-alface** *(Nasonovia ribisnigri)* e o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)* aplicar **50 ml/hl (500 ml/ha)**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Ameixeira:** Contra o **afídeo-negro-do-pessegueiro** *(Brachycaudus persicae)*, o **afídeo-verde-da-ameixeira** *(Brachycaudus helichrysi)*, o **afídeo-farinhento** *(Hyalopterus pruni)*, o **tripe** *(Thrips major)* e o **tripe-do-tabaco** *(Thrips tabaci)* aplicar **30-50 ml/hl**. Contra a **anársia** *(Anarsia lineatella)* aplicar **50-70 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Batateira:** Contra o **afídeo** *(Macrosiphum euphorbiae)*, o **afídeo-do-agrião** *(Aphis nasturtii)*, o **afídeo-da-batateira** *(Aulacorthum solani)* e o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)* aplicar **50 ml/hl (500 ml/ha)**. Contra o **escaravelho-da-batateira** *(Leptinotarsa decemlineata)* aplicar **30 ml/hl (300 ml/ha)**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Beringela**, **Pimenteiro** e **Tomateiro:** Contra a **lagarta-do-tomate** *(Helicoverpa armigera)* aplicar **30 ml/hl (300 ml/ha)**. Contra o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)*, o **afídeo-negro** *(Aphis fabae)* e a **mosca-branca-das-estufas** *(Trialeurodes vaporariorum)* aplicar **50 ml/hl (500 ml/ha)**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Cenoura:** Contra o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)*, o **afídeo-da-cenoura** *(Aphis lambersi)* e o **afídeo-das-umbeliferas** *(Cavariella aegopodii)* aplicar **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Cerejeira:** Contra o **afídeo-da-cerejeira** *(Myzus cerasi)*, o **tripe** *(Thrips major)*, o **tripe-do-tabaco** *(Thrips tabaci)* e a **mosca-da-cereja** *(Rhagoletis cerasi)* aplicar **30-50 ml/hl**. Contra a **cochonilha-de-São-José** *(Quadraspidiotus perniciosus)* aplicar **50-75 ml/hl** (neste último caso, em tratamentos de verão, contra formas móveis de jovens e adultos). Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Citrinos (Laranjeira, Limoeiro, Tangerineira (inclui clementina e híbridos) e Lima):** Contra o **afídeo** *(Aphis craccivora)*, o **afídeo-do-algodoeiro:** *(Aphis gossypii)*, o **afídeo-dos-citrinos** *(Aphis spiraecola)*, o **afídeo** *(Myzus ornatus)*, o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)* e o **afídeo-negro-dos-citrinos** *(Toxoptera aurantii)* aplicar **40-50 ml/hl (400 a 500 ml/ha)**. Contra a **cochonilha-negra** *(Saissetia oleae)*: **40-50 ml/hl (400 a 500 ml/ha)**. Contra a **mosquinha-branca-dos-citrinos** *(Aleurothrixus floccosus)* aplicar **50 ml/hl (500 ml/ha)**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Efetuar uma aplicação no máximo. ▪ **Colza:** Contra a **áltica-da-couve** *(Psylliodes chrysocephala)* aplicar **30 ml/hl**. Contra o **afídeo-da-couve** *(Brevicoryne brassicae)* aplicar **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Couve-bróculo** e **Couve-flor:** Contra a **lagarta-da-couve** *(Pieris brassicae)* e as **lagartas** *(Agrotis sp.)* aplicar **30 ml/hl**. Contra o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)* e a **mosca-branca-da-couve** *(Aleyrodes proletella)* aplicar **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Damasqueiro:** Contra o **afídeo-negro-do-pessegueiro** *(Brachycaudus persicae)*, o **afídeo-farinhento** *(Hyaloptrus pruni)*, o **afídeo-do-lúpulo** *(Phorodon humuli)*, o **afídeo-verde-da-ameixeira** *(Brachycaudus helichrysi)*, o **tripe** *(Thrips major)* e o **tripe-do-tabaco** *(Thrips tabaci)* aplicar **30-50 ml/hl**. Contra a **anársia** *(Anarsia lineatella)* aplicar **50-70 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Ervilheira:** Contra o **afídeo-da-ervilheira** *(Acyrthosiphon pisum)* aplicar **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Espargo:** Contra o **afídeo-do-espargo** *(Brachycorynella asparagi)* aplicar **50 ml/hl**. O tratamento só deverá ser feito após a colheita do espargo, em presença da praga e sobre a planta. O tratamento só deverá ser feito após a colheita do espargo, em presença da praga e sobre a planta. Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Feijoeiro (consumo em seco e consumo em fresco – vagem):** Contra o **afídeo-negro** *(Aphis fabae)* aplicar **50 ml/hl (500 ml/ha)**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Macieira:** Contra o **afídeo-verde-da-macieira** *(Aphys pomi)*, o **afídeo-cinzento-da-macieira** *(Dysaphis plantaginea)*, o **antónomo-da-macieira** *(Anthonomus pomorum)*, o **tripe** *(Thrips major)*, o **tripe-do-tabaco** *(Thrips tabaci)* e a **mosca-do- mediterrâneo** *(Ceratitis capitata)* aplicar **30-50 ml/hl**. Contra o **bichado-da-fruta** (*Cydia pomonella)* aplicar **30 ml/hl**. Contra a **cochonilha-de-São-José** *(Quadraspidiotus perniciosus)* aplicar **50-75 ml/hl** (neste último caso, em tratamentos de verão, contra formas móveis de jovens e adultos). Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Milho:** Contra a **nóctua** *(Agrotis ipsilon)*, a **nóctua-cinzenta** *(Agrotis segetum)* e o **tripe-da-Califórnia** *(Frankliniella occidentalis)* aplicar **30 ml/hl**. Contra os **afídeos** *(Aphis sp.)*, o **percevejo-verde** *(Nezara viridula)*, o **piral-do-milho (Ostrinia nubilalis)** e a **sesamia** *(Sesamia nonagrioides)* aplicar **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Morangueiro:** Contra o **afídeo-do-morangueiro** *(Chaetosiphum fragaefolii)* e o **bicho-conta** *(Porcellio scaber)* aplicar **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Oliveira:** Contra a **cochonilha-negra** *(Saissetia oleae)* aplicar **40-60 ml/hl**. Contra a **traça-da-oliveira** *(Prays oleae)*, o **tripe-da-oliveira** *(Liothrips oleae)* e a **mosca-da-azeitona** *(Bactrocera oleae)* aplicar **50 ml/hl**. No caso da **mosca-da-azeitona**, fazer uma aplicação preventiva durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Nas restantes situações, aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75).Em todas as pragas da oliveira efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Pepino:** Contra o **afídeo-do-algodoeiro** *(Aphys gossypii)* e a **mosca-branca-das-estufas** *(Trialeurodes vaporariorum)*: **50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Pereira:** Contra a **psila-da-pereira** *(Cacopsylla pyri)* aplicar **70 ml/hl (700 ml/ha)**. Contra o **afídeo-verde-da-macieira** *(Aphys pomi)*, o **afídeo-cinzento-da-pereira** *(Dysaphis pyri)*, o **antónomo-da-pereira** (*Anthonomus pyri)*, o **tripe** *(Thrips major)*, o **tripe-o-tabaco** *(Thrips tabaci)*, a **cecidómia-das-folhas-da-pereira** *(Dasineura pyri)* e a **mosca-do-mediterrâneo** *(Ceratitis capitata)* aplicar **30-50 ml/hl (300 a 500 ml/ha)**. Contra o **bichado-da-fruta** (*Cydia pomonella)* aplicar **30 ml/hl** (300 ml/ha). Contra a **cochonilha-de-São-José** *(Quadraspidiotus perniciosus)* aplicar **50-70 ml/hl (500 a 700 mL/ha)** (neste último caso, em tratamentos de verão, contra formas móveis de jovens e adultos). Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Pessegueiro:** Contra o **afídeo-verde** *(Myzus persicae)*, o **afídeo-negro-do-pessegueiro** *(Brachycaudus persicae)*, o **tripe-do-tabaco** *(Thrips tabaci)* e a **mosca-do-mediterrâneo** *(Ceratitis capitata)* aplicar **30-50 ml/hl**. Contra a **cochonilha-de-São-José** *(Quadraspidiotus perniciosus)* aplicar **50-75 ml/hl** (neste último caso, em tratamentos de verão, contra formas móveis de jovens e adultos). Contra a **traça-oriental-do-pessegueiro** *(Grapholita molesta)* e a **anársia** *(Anarsia lineatella)* aplicar **50-70 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias. ▪ **Trigo** e **Cevada:** Contra os **afídeos** *(Aphis sp.)* aplicar **30-50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 15 dias. ▪ **Videira:** Contra a **traça-dos-cachos** *(Lobesia botrana)* aplicar **40-60 ml/hl**. Contra o **piral-da-vinha** *(Sparganothis pilleriana)*, a **nóctua** *(Noctua cornes)*, a **nóctua** *(Noctua fimbriata)*, a **nóctua** *(Noctua orbona)*, a **nóctua** *(Noctua pronuba)*, a **cicadela-da-vinha** *(Empoasca vitis)* e o **charuteiro** *(Bycticscus betulae)* aplicar **30-50 ml/hl**. Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59) ou após a floração (BBCH 71-75). Efetuar 2 aplicações no máximo, com um intervalo mínimo de 14 dias.

INTERVALO DE SEGURANÇA: **3 dias** em beringela, morangueiro, pepino, pimenteiro e tomateiro; **7 dias** em alface, alho-francês, ameixeira, batateira, cebola, cenoura, cerejeira, couve-bróculo, couve-flor, damasqueiro, ervilheira, feijoeiro (consumo em fresco: vagem), macieira, oliveira, pereira, pessegueiro e videira; **28 dias** em feijoeiro (consumo em seco); **30 dias** em beterraba-sacarina, cevada, laranjeira, lima, limoeiro, milho, tangerineira (inclui clementina e híbridos) e trigo; **45 dias** em colza; **Não aplicável** em espargo.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O número máximo de aplicações com o produto DECA não pode ser superior a 1 ou 2, dependendo da cultura, para o total dos inimigos, por período cultural.

UTILIZAÇÕES MENORES
A eficácia e a toxicidade resultantes das seguintes **utilizações menores aprovadas** são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

CULTURAS	INIMIGOS A ATINGIR	ÉPOCA DE APLICAÇÃO (PULVERIZAÇÃO FOLIAR)	DOSE (ML/HA)	VOLUME DE CALDA (L/HA)
NOGUEIRA	**Afídeo-da-nogueira** *(Chromaphis juglandicola)*	Iniciar as aplicações ao aparecimento da praga, desde a fase de início do crescimento dos jovens lançamentos (BBCH 31) até à fase em que os frutos atingiram 50% do seu calibre final (BBCH 75).	**500** (correspondente a uma concentração de **50 ml/hl**)	**1000**
AVELEIRA	**Afídeo-da-avelã** *(Myzocallis coryli)*			
NOGUEIRA	**Afídeos** *(Hyalopterus sp.)*			
	Afídeo-verde-da-aveleira *(Corylobium avellanae)*			
	Monosteira *(Monosteira unicostata)*			
AVELEIRA	**Balanino:** *Curculio elephas / Curculio nucum*			
	Zêuzera *(Zeuzera pyrina)*			
	Bichado-da-fruta *(Cydia pomonella)*			

O NÚMERO MÁXIMO DE APLICAÇÕES NÃO PODE SER SUPERIOR A 2 PARA O TOTAL DAS FINALIDADES E POR PERÍODO CULTURAL, COM UM INTERVALO MÍNIMO DE 14 DIAS.
INTERVALO DE SEGURANÇA: **30 dias em nogueira e em aveleira (todas as finalidades).**
SPe3 – Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às zonas circunvizinhas.
SPe3 – Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30 metros em relação às águas de superfície, em frutos secos.
SPe8 – Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas.
(As três Frases-Tipo Suplementares indicadas acima são específicas para estas utilizações menores aprovadas.)

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS
Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se a alternância deste produto com inseticidas com diferentes modos de ação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA
Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO
▪ Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido. ▪ Calcular o volume de calda gasto por hectare em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas). ▪ Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por hectare, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose. ▪ Não aplicar com tempo ventoso. ▪ **Volume de calda a utilizar para todas as culturas: 1000 L/ha**

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



▪ Líquido e vapor inflamáveis. ▪ Nocivo por ingestão. ▪ Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. ▪ Provoca lesões oculares graves. ▪ Nocivo por inalação. ▪ Pode provocar irritação das vias respiratórias. ▪ Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ▪ Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. ▪ Não respirar a núvem de pulverização. ▪ Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. ▪ Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. ▪ Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular, proteção facial. ▪ SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. ▪ Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ▪ Caso sinta indisposição, contacte o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ▪ Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. ▪ Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. ▪ **Ficha de segurança fornecida a pedido**. ▪ Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. ▪ Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 30 metros em relação às águas de superfície em pomóideas, prunoideas e frutos secos; de 20 metros em videira, citrinos e oliveira e 10 metros nas culturas hortícolas, cereais, milho e colza. ▪ Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às zonas circunvizinhas. ▪ Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. ▪ Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. ▪ O aplicador deverá usar luvas de proteção adequadas, proteção ocular e proteção facial durante a preparação da calda e aplicação do produto. ▪ Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. ▪ Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

PRIMEIROS SOCORROS

Afaste-se da zona de perigo ▪ **Em caso de inalação:** no caso de distúrbio respiratório, contacte o INEM através do **112** ou o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do **800 250 250** ▪ **Em caso de contacto com a pele:** remova todas as roupas contaminadas, lave de imediato a zona exposta com água corrente ▪ **Em caso de contacto com olhos:** lavar imediatamente durante 15 a 20 minutos sob água corrente, tendo cuidado para ter as pálpebras abertas ▪ **Em caso de ingestão:** lavar a boca imediatamente com água. Não induza o vómito sem orientação médica. Entre em contacto com o INEM ou com o CIAV ▪ Em todos os casos, se os sintomas persistirem ou se não se sentir bem, consulte de imediato um médico e mostre-lhe o rótulo e/ou a **Ficha de Dados de Segurança** (que contém informações mais detalhadas) ▪ Em caso de intoxicação de animais, entre em contacto com o seu veterinário

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV) pelo telefone 800 250 250 / Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

DECA

Inseticida

Concentrado para emulsão (EC) com 25 g/L ou 2,5 % (p/p) de deltametrina

Contém: nafta (petróleo) aromática leve

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

UFI: EHXW-F8VK-T00S-JP83

DATA DE PRODUÇÃO E Nº DE LOTE: VER EMBALAGEM

CONTÉM:

5L

Distribuído por:
Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
Telef.: 217 998 440
www.nufarm.com/pt

Titular da Autorização de Venda:
SHARDA CROPCHEM ESPAÑA, S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina nº 3, 12th floor
30006 Murcia- España
Tel.: +34 868 127 589

Nufarm