STADIO® F

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda **n.º 2072** concedida pela DGAV
UFI: E1S1-S03Y-6004-2MGM

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 3,75 % (p/p) de benalaxil-M + 48 % (p/p) de folpete.



CONTÉM:
5 Kg
Nº DE LOTE E DATA DE PRODUÇÃO: VER EMBALAGEM

PERIGO



Fungicida

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

O **STADIO F** é fungicida sistémico e de superfície com base em benalaxil-M, do grupo das fenilamidas (tipo acilalanina) e folpete, do grupo das ftalimidas. O benalaxil-M inibe a síntese dos ácidos nucleicos atuando na RNA polimerase I (grupo FRAC - 4) e o folpete inibe vários processos metabólicos, atuando em diversos enzimas (grupo FRAC - M 04). Tem uma atividade preventiva, curativa e anti-esporulante.

UTILIZAÇÕES, DOSES/ CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira de uvas para vinificação. Míldio (*Plasmopara viticola*): **200g/hl** ou **2 kg/ha.** Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, o produto deve ser usado preventivamente, ou seja, os tratamentos devem iniciar-se ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença, no período que decorre entre as 7 a 8 folhas e o bago grão de chumbo (BBCH 15 a BBCH73). A persistência do tratamento é de 12 a 14 dias. Utilizar a concentração de 200-400 g/100 litros de água. A dose a utilizar em pleno desenvolvimento vegetativo deve ser de 2kg/ha max.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha fenilamidas, mais de 2 vezes por ano.

INTERVALO DE SEGURANÇA: 28 dias

INTERVALO DE REENTRADA: 0

RESTRIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar só em videiras de uvas para vinificação.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/ doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

Volume de calda recomendado: 500 - 1000 L/ha.

valorfito

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

▪Pode provocar uma reação alérgica cutânea. ▪ Provoca lesões oculares graves. ▪ Tóxico por inalação. ▪ Suspeito de provocar cancro. ▪ Afeta os órgãos (trato respiratório) após exposição prolongada ou repetida. ▪ Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ▪ Pedir instruções específicas antes da utilização. ▪ Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. ▪ Não respirar as poeiras e a nuvem de pulverização. ▪ Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. ▪ Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. ▪ EM CASO DE INALAÇÃO: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. ▪ SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. ▪ EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. ▪ Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ▪ Em caso de indisposição, consulte um médico. ▪ Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. ▪ Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. ▪ Recolher o produto derramado. ▪ Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. ▪ Armazenar em local fechado à chave. ▪ Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. ▪ Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. ▪ Ficha de segurança fornecida a pedido. ▪ Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. ▪ Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro do grupo das fenilamidas mais que 2 vezes durante o ciclo cultural. ▪ Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 15 metros em relação às águas de superfície. ▪ Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. ▪ O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção, proteção ocular e máscara respiratória durante a preparação da calda e aplicação do produto. ▪ Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas ao tratamento às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. ▪ Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo o cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Armazenamento: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:
Gowan Crop Protection Limited
Rothamsted Research | West Common, Harpenden
Hertfordshire, AL5 2JQ, UK

DISTRIBUÍDO POR:
Nufarm Portugal, Lda.
Praça de Alvalade, 7 - 6ºEsq. | 1700-036 Lisboa – PORTUGAL
Tel.: 217 998 440 | www.nufarm.com/pt

® - marca registada da Gowan Crop Protection

5 600209 651642

Gowan® CROP PROTECTION LIMITED

510012434_102026

nufarm