

Berelex® 40SG

REGULADOR DE CRESCIMENTO

GRÂNULOS SOLÚVEIS EM ÁGUA (SG)

Autorização de venda n.º 0783 concedida pela DGAV

Regulador de crescimento das plantas

Grânulos solúveis em água (SG) com 400 g/Kg ou 40 % (p/p) de ácido giberélico

- ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
- PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
- MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
- LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

CONTÉM
25 g
(10 x 2,5 g)

Nufarm

Fabricao:
Data de

Fabricao:
Lote de

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES

Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica.

Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições em que o produto vai ser utilizado.

Dada a grande variabilidade de comportamento das culturas resultante da aplicação deste produto, o mesmo só deverá ser utilizado sob orientação técnica.

Aconselha-se a realização de ensaios prévios nas variedades e condições em que o produto vai ser utilizado.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

■ Evitar a contaminação das águas pela nuvem de pulverização, ou com as águas de lavagem dos equipamentos.

■ Não misturar com produtos de reação alcalina (ex. calda bordalesa).

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma pasta homogênea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre. Evitar deixar a mistura em repouso.

Não é aconselhável o fracionamento de pastilhas na preparação das caldas.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.

Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

© marca registada Valent BioSciences LLC, USA.

List No. 60218-35-01
05-5153/R3

Distribuído por:

Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade 7, 6º Esq.
1700-036 Lisboa – PORTUGAL
Tel: 217 998 440
www.nufarm.pt

VALENT BIOSCIENCES
Valent BioSciences, LLC
870 Technology Way
Libertyville, IL 60048 USA
Tel: (1) 847-4968-4790

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

O **BERELEX 40SG** é um regulador de crescimento das plantas que induz a formação de frutos por partenocarpia e interfere no desenvolvimento da senescência.

Culturas	Efeito a atingir	Concentração/Dose	Condições de aplicação
Alcachofra	Para preparação da colheita e aumento do rendimento	25 g/ha ou 5 g/hl Volume de calda: 500 L/ha	Aplicar quando estejam visíveis os primeiros botões florais (BBCH 41-43). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo de 14 a 21 dias.
Laranjeira (exceto Valencia), limoeiro, mandarinas e toranjeira	Para promover a frutificação	20 a 50 g/ha ou 2,5 g/hl Volume de calda: 800 a 2000 L/ha	Aplicar da queda das pétalas até ao início da queda dos frutos (BBCH 67-71). Realizar no máximo 2 aplicações com intervalo de 7 dias.
	Para melhorar a qualidade da epiderme do fruto e a colheita	20 a 150 g/ha ou 2,5 a 5 g/hl Volume de calda: 800 a 3000 L/ha	Aplicar no início da mudança de cor do fruto (BBCH 81). Realizar no máximo 1 aplicação.
Pereira	Para promover a frutificação, o peso do fruto e o rendimento	10-25 g/ha ou 1,25 - 2,5 g/hl Volume de calda: 800 a 1000 L/ha	Na ausência de geada, aplicar com 30% das flores abertas até à plena floração, quando 50 % das flores estão abertas (BBCH 63-65). Não aplicar após mais de 48 horas de ter ocorrido a geada. Repetir o tratamento no caso de ocorrerem novas geadas. Aplicar a dose inferior quando a frutificação é fraca. Realizar no máximo 3 aplicações com intervalo de 2 dias.
	Para atenuar os efeitos da geada	10 - 25 g/ha ou 1,25 - 2,5 g/hl Volume de calda: 800 a 1000 L/ha	Na presença de geada, aplicar durante a fase de floração, desde o estado de botão rosa, em que as pétalas alongam-se começando a ficar visíveis e as sementes se encontram ligeiramente abertas, até ao final da floração (BBCH 57-69). Realizar no máximo 3 aplicações com intervalo de 2 dias.
Videira (uva para vinificação)	Para favorecer o vingamento e calibre dos frutos	2,5 g/ha ou 5 g/ha Volume de calda: 200 L/ha	Realizar no máximo 1 aplicação até à plena floração (BBCH 67)
Cerejeira	Para melhorar a qualidade do fruto e a colheita	5 g/ha ou 50 g/ha Volume de calda: 1000 L/ha	Realizar no máximo 1 aplicação até ao início da maturação (BBCH 81)
Ornamentais (em estufa)	Para aumentar o comprimento do caule em flores de corte	37,5 g/ha ou 3,75 g/hl Volume de calda: 1000 L/ha	Aplicar dentro de uma semana após a transplantação. Realizar no máximo 1 aplicação.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros
- Evitar respirar as poeiras e a nuvem de pulverização.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Usar vestuário de proteção adequado nas aplicações em estufa.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, camisa de mangas compridas, calças, meias e sapatos.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.
- ARMAZENAMENTO: manter em local seco ventilado e protegido dos raios solares.

Nota: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na lei.



A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado

Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos: Telef: 800 250 250

Um produto:

KENOGARD
CULTIVAMOS LA INVESTIGACION · 研究探知

KENOGARD, S.A.
Poeta Joan Maragall, 51,
Planta 3ª, Of. 3
28020 Madrid (Espanha)
Tel. +34 91 159 4900
www.kenogard.es

