

# SULCOGAN®



# 1L

LOTE E DATA DE PRODUÇÃO:  
VER EMBALAGEM

Titular da Autorização de Venda:  
Nufarm Portugal, Lda  
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.  
1700-036 Lisboa, Portugal  
t. 217 998 440 | www.nufarm.com



Autorização de venda nº 0471 concedida pela DGAV

**Herbicida sistémico no controlo  
da junça, infestantes anuais  
dicotiledóneas e gramíneas  
na cultura do milho**

**Suspensão concentrada (SC) contendo  
300 g/L ou 26,5 % (p/p) de sulcotriona**

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL  
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O  
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**



MILHO



## INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

O **SULCOGAN®** contém sulcotriona que pertence ao grupo químico das ciclohexanodiona, pertencente ao grupo dos "inibidores da biossíntese do carotenoide". É um herbicida sistémico seletivo para o milho, absorvido pelas raízes e, principalmente pelas folhas, de aplicação em pós-emergência no controlo de infestantes anuais dicotiledóneas e gramíneas e específico para a junça.

**UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**  
**MILHO** – 1, 5L /ha – Aplicar em pós-emergência da cultura e quando as infestantes tiverem 2 a 4 folhas. A aplicação deverá ser dirigida ao solo.

**INFESTANTES SUSCETÍVEIS:** Bolsa-do-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), catassol (*Chenopodium album*), figueira-do-inferno (*Datura stramonium*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), juta-da-china (*Abutilon theophrasti*), margaça (*Matricaria chamomilla*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), mal-casada (*Polygonum lapathifolium*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), erva-moira (*Solanum nigrum*).

**INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS:** Bredos (*Amaranthus* spp.), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), *Veronica* spp.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não atingir terrenos e culturas vizinhas da área a tratar.
- Não aplicar o herbicida em mistura com adubos líquidos.
- Não aplicar em campos de multiplicação de milho.
- A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos, pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente suscetíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas com modo de ação diferente.

## MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No depósito onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.

## MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 Kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.  
**Volume de calda – 300 a 600 L/ha.**

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Contém sulcotriona e 1,2-Benzisotiazolina-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.
- Suspeito de afetar o nascituro.
- Pode afetar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis / nuvem de pulverização
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos agrícolas adjacentes a águas de superfície.

**Em caso de Intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef. 808 250 143**

**NOTA:** Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de receção autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



0000000000