

TOMAHAWK®



CONTÉM:

5L

Nº. DE LOTE E DATA DE
PRODUÇÃO: VER EMBALAGEM

Titular da Autorização de Venda:

Nufarm Portugal, Lda

Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.

1700-036 Lisboa, Portugal

Telef.: 217 998 440

www.nufarm.pt

TOMAHAWK® é uma marca
registada por uma empresa
do grupo ADAMA Agricultural
Solutions Ltd.

510010583_042021

**Concentrado para emulsão (EC), contendo
200g/L ou 20,6% (p/p) de Fluroxipir
(na forma de éster de metilheptílico)**

Contém nafta de petróleo (petróleo) aromático leve

**Herbicida de translocação para
o controlo de infestantes dicotiledóneas**

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O
AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS**

Autorização de venda nº **0197** concedida
pela DGAV



 **Nufarm**

TOMAHAWK®

TOMAHAWK® é um herbicida de translocação, principalmente absorvido pelas folhas, para o controlo de infestantes dicotiledóneas em trigo, cevada, milho e prados de gramíneas e para o controlo de infestantes dicotiledóneas anuais em pomares de citrinos (laranjeira, tangerineira, limoeiro e laranjeira-azedo), macieiras, pereiras e avelãs e em olivais. **TOMAHAWK®** contém fluroxipir, pertencente à família dos ácidos piridinocarboxílicos. **Classificação do modo de acção das substâncias activas de acordo com o HRAC:**

GRUPO 4 HERBICIDA

UTILIZAÇÕES, DOSES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

■ **Citrinos (laranjeira, tangerineira, limoeiro e laranjeira-azedo):** 1,5L/ha, a aplicação pode ser realizada ao longo de todo o ano. Recomenda-se a aplicação em bandas. ■ **Oliveira:** 1,5 L/ha, a aplicação pode ser realizada ao longo de todo o ano, após a colheita. Recomenda-se a aplicação em bandas. ■ **Trigo e Cevada:** 0,75 a 1 L/ha, aplicar desde o estado de 3 folhas do cereal até ao fim do encanamento. ■ **Milho:** 0,75 a 1 L/ha, aplicar entre as 3 e 5 folhas da cultura. ■ **Macieira, Pereira e Avelã:** 1,5 L/ha, aplicar o produto, no mínimo, 15 dias antes da colheita. **Prados de gramíneas:** 1,5 a 2 L/ha, aplicar desde o estado de 3 folhas verdadeiras do cereal (BBCH 13). Para o controlo de *Rumex spp.*, aplicar no estado de roseta (intervalo de reentrada 15 dias). Aplicar sempre o **TOMAHAWK®** quando as infestantes estiverem em crescimento activo.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Corriola (*Convolvulus arvensis*), **Galium spp.**, **Beldroega** (*Portulaca oleracea*), **Labaças** (*Rumex spp.*), **Mostarda-dos-Campos** (*Sinapis arvensis*), **Morugem-branca** (*Stellaria media*), **Malvão** (*Abutilon theophrasti*), **Malvas** (*Malva spp.*), **Não-me-esqueças** (*Myosotis arvensis*), **Parietarias** (*Parietaria spp.*), **Ruiva-dos-tinteiros** (*Rubia tinctorum*), **Silvas** (*Rubus spp.*), **Tojos** (*Ulex spp.*) e **Urtigas** (*Urtiga spp.*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar em plantações de árvores com menos de 4 anos. Evitar aplicações durante as horas de maior temperatura durante o Verão e no Inverno em períodos de frio prolongado com temperaturas inferiores a 6°C. Não aplicar em prados se existirem trevos ou outras leguminosas. Não aplicar em dias de vento e tomar precauções para evitar danos em culturas adjacentes. Não molhar as árvores, em especial os rebentos jovens. A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de resistência em espécies anteriormente susceptíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas com modo de acção diferente.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar adequadamente o pulverizador calculando o volume de calda a utilizar por hectare (L/ha), de modo a assegurar a distribuição uniforme da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser calculados em função da área a aplicar. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 Kg/cm² e o uso de atomizadores. Após a aplicação lavar bem o material com água e sabão. O **volume de calda** a aplicar é **200 a 600 L/ha**.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

■ **Ficha de segurança** fornecida a pedido. ■ **Líquido e vapor inflamáveis.** ■ **Não respirar** a nuvem de pulverização. ■ **Pode ser mortal** por ingestão e penetração nas vias respiratórias. ■ **Provoca irritação cutânea.** ■ **Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.** ■ **Provoca irritação ocular grave.** ■ **Pode provocar irritação das vias respiratórias.** ■ **Pode provocar sonolência ou vertigens.** ■ **Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes** – Não fumar. ■ **Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial.** ■ **Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.** ■ **Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.** ■ **Para protecção dos organismos aquáticos** respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros em milho, trigo e cevada e de 10 metros em oliveira e citrinos. ■ **EM CASO DE INGESTÃO:** contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ■ **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar suavemente com sabonete e água abundantes. ■ **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. ■ **NÃO provocar o vômito.** ■ **Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.** ■ **Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos**

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telf: 800 250 250

Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

NOTA: Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

510010584_042021

