NEXTER

Suspensão concentrada (SC) com 100 g/L ou 9,70% (p/p) de piridabena

CONTÉM:

5L

LOTE E DATA DE FABRICO:
VER EMBALAGEM

5 600242 295841

Inseticida /Acaricida

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Autorização de venda **nº 1744** concedida pela DGAV

Titular da Autorização de Venda:
Nissan Chemical Europe S.A.S.
Parc d'Affaires de Crécy 10A
rue de la Voie Lactée
69370 Saint Didier au Mont d'Or
França
Tel: + 04 37 64 40 20

Distribuído por:
Nufarm Portugal, Lda
Praça de Alvalade, 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa, Portugal
Telef.: 217 998 440
www.nufarm.com

Nufarm

510010607_042021

INDICAÇÕES RELATIVAS À SUA UTILIZAÇÃO (INCLUINDO AS PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS)

O **NEXTER** é um inseticida de contato não sistémico, eficaz nas diferentes fases do desenvolvimento de ácaros e mosca-branca (larvas e adultos) em plantas ornamentais (em viveiros sob coberto ou cultura protegida) e em citrinos. O **NEXTER** inibe o transporte de eletrões do complexo mitocondrial I e previne a respiração celular. Segundo o IRAC (Comité de Ação de Resistência a Inseticidas), a substância ativa do **NEXTER** está incluída no grupo 21A, classificada como METI (Inibidor de Transporte de Eletrões Mitocondriais). Os compostos METI, como o piridabena, são altamente eficazes contra todos os estágios de ácaros.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURA	PRAGA	DOSE (L/ha)	VOLUME DE CALDA (L/ha)	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Plantas[a] e arbustos[b] ornamentais para a produção de folha, flor e/ou fruto (em viveiros sob coberto ou cultura protegida)	**Ácaros** (*Tetranychus sp.; Polyphagotarsonemus latus; Phytonemus sp.; Bryobia sp.; Brevipalpus sp.; Panonychus sp.*)	1,4	500-1400	Efetuar os tratamentos desde a emergência da inflorescência ou dos botões florais até à maturação completa (BBCH 11-89).
Laranjeira, toranjeira, tangerineira (incluindo clementinas e outros híbridos), limoeiro, limeira, cidrão e laranjeira-azeda.	**Aranhiço-vermelho-dos-citrinos** (*Panonychus citri*); **Ácaro -tetraniquídeo** (*Tetranychus urticae e Tetranychus cinnabarinus*); **Ácaro-branco dos citrinos** (*Polyphagotarsonemus latus*); **Ácaro do Texas** (*Eutetranychus banksi*); **Ácaro-das-gemas** (*Aceria sheldoni*); **Mosca branca dos citrinos** (*Aleurothrixus floccosus*).	3	1500-2000	Efetuar os tratamentos desde o final da floração até ao amadurecimento dos frutos (BBCH 69-83).

(a) Antúrio, azálea, begónia, boca de lobo, bolbos de lírios, narcisos, túlipas, jacinto, calibrachoa, cíclame, cineraria, craveiro, crisântemo, dália, estrelícia, evónio dos jardins, gerbera, gipsofila, gladíolo, lantana, louro cerejo, orquídeas, palmeira-dascanárias, sardinheira, petúnia, prótea e roseiras.
(b) Cameleira, alecrim e forsítia.

Intervalo de segurança: 14 dias para citrinos: laranjeira, toranjeira, tangerineira (incluindo clementinas e outros híbridos), limoeiro, limeira, cidrão e laranjeira-azeda.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar o **NEXTER** em culturas que sofram de stress motivado por seca, baixas temperaturas, ataque de parasitas, carências minerais ou outros fatores que causem redução do crescimento. A utilização repetida de produtos à base de substâncias ativas da mesma família química ou com o mesmo modo de ação pode levar ao aparecimento de organismos resistentes. De modo a reduzir este risco devem ser prosseguidas as boas práticas agronómicas e cumpridas as condições de utilização do produto. Aconselha-se ainda a utilização, de forma alternada ou combinada, na mesma parcela, tanto ao longo da época cultural como em rotações, de produtos à base de substâncias ativas de diferentes famílias químicas ou com diferentes modos de ação. Ainda que sejam respeitadas estas regras, não se pode excluir a ocorrência de uma alteração na eficácia deste produto relacionada com estes fenómenos de resistência.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

■ Para evitar contato ou arrastamento do produto para culturas vizinhas, utilizar equipamento de pulverização adequado para direcionar a aplicação à área a ser tratada; ■ Observar regularmente as culturas para detetar os primeiros indivíduos ou surtos de insetos ou ácaros, de modo a ser efetuada uma intervenção precoce nas infestações; ■ Verificar o estado do equipamento de pulverização. De preferência, utilizar bicos de leque e de baixa pressão; ■ Assegurar que o pulverizador não contém resíduos de tratamentos anteriores; ■ Preparar apenas a quantidade de calda necessária para a área a ser tratada; ■ Em caso de misturar o **NEXTER** com outro produto, adicionar em primeiro lugar o **NEXTER** à água da calda, proceder à agitação e de seguida adicionar o outro produto.

PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLOGICAS, ECOTOXICOLOGICAS E AMBIENTAIS

■ Nocivo por ingestão. ■ Nocivo por inalação. ■ Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. ■ Evitar respirar as poeiras, fumos, gases, névoas, vapores e aerossóis. ■ Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. ■ Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. ■ Evitar a libertação para o ambiente. ■ Recolher o produto derramado. ■ Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. ■ Contém (1,2-benzisothiazolin-3-one). Pode provocar uma reação alérgica. ■ Ficha de segurança fornecida a pedido. ■ Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas. ■ Para proteção dos organismos aquáticos respeitar uma zona não pulverizada de 20 metros em relação às águas de superfície para as culturas de citrinos. ■ Perigoso para as abelhas. Para proteção das abelhas e de outros insetos polinizadores, não aplicar este produto durante a floração das culturas. Não utilizar este produto durante o período de presença das abelhas nos campos. ■ Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares. ■ Arejar bem as estufas tratadas até à secagem do pulverizado, antes de nelas voltar a entrar. ■ Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas estes deverão usar, luvas, camisa de mangas compridas, calças, meias e botas. ■ O aplicador deverá usar: luvas de proteção e vestuário de proteção durante a preparação da calda e aplicação do produto. ■ Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado. ■ Após o tratamento lavar bem o material de proteção, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef.: 800 250 250

ARMAZENAMENTO

Manter o produto apenas na embalagem original, num local apropriado, protegido de humidade, geada e raios solares e que seja fresco e ventilado. Não deverá ser armazenado junto de alimentos e bebidas, tanto para consumo humano como animal. Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

NOTA: Qualquer reprodução total ou parcial deste rótulo é proibida. Respeite os usos, doses, condições e precauções de uso mencionadas na embalagem e que foram determinadas de acordo com as características do produto e as aplicações para as quais é recomendado. Com base nisso, conduza as culturas e os tratamentos de acordo com a boa prática agrícola, levando em consideração, sob sua responsabilidade, todos os fatores específicos, como a natureza do solo, as condições meteorológicas, os métodos de cultivo, as variedades de plantas e a resistência de espécies. O fabricante garante a qualidade do produto vendido em sua embalagem original, bem como a sua conformidade com a autorização de comercialização do Ministério da Agricultura. Tendo em conta a diversidade da legislação existente, recomenda-se que, nos casos em que os produtos provenientes de culturas protegidas com esta especialidade

510010608_042021

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num ponto de retorna autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

valorfito