

Novas Práticas Culturais.



CARNADINE®

Autorização de venda nº 1175 concedida pela DGAV

O CARNADINE MANTEM A MAIORIA DOS USOS ONDE JÁ ESTAVA AUTORIZADO COM LIGEIRAS ALTERAÇÕES À PRÁTICA CULTURAL

Na sequência da revisão dos Limites Máximos de Resíduos (LMR) nas culturas onde está autorizado o uso de acetamipride, a DGAV estabeleceu novas práticas agrícolas que deverão ser seguidas desde já, para que, à colheita das culturas, esses mesmos limites não sejam ultrapassados.



Assim, a **NUFARM** apresentou inúmeros estudos para garantir a segurança do seu produto **CARNADINE** para as culturas em causa e apresentam-se aqui as práticas culturais que terão de ser seguidas de forma a cumprir os novos limites.

Embora a nova legislação entre em vigor apenas em **Agosto 2025**, a **NUFARM** quer assegurar as melhores condições de utilização do seu produto de forma a propiciar a correta utilização do mesmo para que os LMR à colheita sejam garantidos, aplicando desde já as novas práticas de forma a cumprir a legislação à data da colheita das culturas.

PARA TODAS AS CULTURAS: Máximo 1 ou 2 tratamentos por pulverização foliar, de acordo com as culturas, para o conjunto dos inimigos por cultura e ciclo cultural. Não aplicar durante a floração das culturas. **OS USOS MENORES** (Psila-Africa-dos-citrinos) **MANTÊM-SE.**

NOVAS PRÁTICAS CULTURAIS

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO (a leitura deste folheto não dispensa a leitura atenta do rótulo do produto).

■ **BATATEIRA:** Escaravelho: 100-150 ml/h e Afídeos: 200 ml/h. Tratar em presença da praga, desde o desenvolvimento das folhas até maturação dos tubérculos (BBCH 10-89). **Máximo 2 aplicações** por campanha com um intervalo mínimo de 7 dias.; **Volume de calda:** 300 a 600 l/ha. **Intervalo de segurança:** 7 dias. ■ **BERINGELA** Afídeos: 20 a 25 ml/hl (Máx: 0,25 L/ha) **Moscas-brancas:** 35 a 50 ml/hl (Máx: 0,5 L/ha). Tratar em presença da praga desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 10-89). **Máximo 2 aplicações** por campanha com um intervalo mínimo de 20 dias. **Volume de calda:** 500 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 3 dias (ESTUFA); 7 dias (AR LIVRE). ■ **TOMATEIRO** Afídeos: 20 a 25 ml/hl (Máx: 0,25 L/ha). Desde folhas até início floração; do fim da floração até à colheita (BBCH 10-59 e BBCH 70-89); **Máximo 1 aplicação** por campanha. **Volume de calda:** 500 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 3 dias. **Moscas-brancas** (AR LIVRE): 0,325 L/ha. Do desenvolvimento das folhas ao início da floração; do fim da floração à colheita (BBCH 10-59 e BBCH 70-89). **Máximo 1 aplicação** por campanha. **Volume de calda:** 500 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 7 dias. ■ **PIMENTEIRO** (ar livre) Afídeo: 0,15 L/ha. Do desenvolvimento das folhas ao início da floração; Do fim da floração à colheita (BBCH 10-59 e BBCH 70-89). **Máximo 1 aplicação** por campanha. **Volume de calda:** 500 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 7 dias. ■ **COUVES Afídeo-da-couve:** 175 a 250 ml/ha; **Traça-da-couve:** 250 a 350 ml/ha. Do desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 10-49). **Máximo 1 aplicação** por campanha. **Volume de calda:** 500 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 14 dias. ■ **CITRINOS** Afídeos: 25 ml/hl (Máx 350 ml/ha); **Mineira-das-folhas:** 35 a 50 ml/hl (Máx: 0,7 L/ha). Do desenvolvimento dos rebentos até ao início da floração (BBCH 31-61), pulverização visando folhas jovens. **Volume de calda:** 1000 a 1400 L/ha; **Intervalo de segurança:** 14 dias. **Cochonilha-pinta-vermelha e cochonilha-algodão** 50-70 ml/hl (Máx: 1,5 L/ha) Ao aparecimento das formas móveis, desde o início do desenvolvimento dos frutos até à colheita (BBCH 71-89). **Intervalo de segurança:** 60 dias; **Volume de calda:** 2000 a 3000 L/ha. **Máximo 2 aplicações**, intervalo mínimo 30 dias. Não aplicar à floração. ■ **MACIEIRA e PEREIRA** Afídeos; Hoplocampa; Bichado; **Lagartas-mineiras:** 25 ml/hl (Máx: 0,25 L/ha). Desde as folhas em desenvolvimento, até início da floração e do final da floração à maturação (BBCH 10-59 e BBCH 70-81). **Máximo 2 aplicações**, com um intervalo mínimo de 60 dias. **Volume de calda:** 750 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 21 dias. Não aplicar durante a floração. ■ **AMEIXEIRA** Afídeos: 25 ml/hl (Máx: 250 ml/ha). Da floração até à colheita (BBCH 69-89). **Máximo 2 aplicações**, com um intervalo mínimo de 20 dias. **Volume de calda:** 750 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 14 dias. ■ **CEREJEIRA Afídeo-da-cerejeira:** 15 a 25 ml/hl (Máx de 250 ml/ha). Do início do desenvolvimento das folhas até ao fim da floração (BBCH 10-69); **Mosca-da-cereja:** 25 a 35 ml/hl (Máx: 350 ml/ha). Do desenvolvimento dos frutos até à colheita (BBCH 71-89). **Máximo 2 aplicações**, com um intervalo mínimo de 14 dias. **Volume de calda:** 750 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 3 dias. ■ **DAMASQUEIRO Afídeos:** 20 ml/hl (Máx: 0,2 L/ha). Desde final da floração (BBCH >69). **Máximo 1 aplicação** por ciclo cultural. **Volume de calda:** 750 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 21 dias. ■ **OLIVEIRA** (Azeitona para azeite) **Traça-da-oliveira:** 50 ml/hl (máx. 0,5 L/ha), a partir do estado de 50% das flores abertas (desde BBCH 65); **Mosca-da-azeitona:** 25 a 50 ml/hl (máx. 0,5 L/ha) Fruto 50% do tamanho, caroço a iniciar a lenhificação (BBCH >75); **Máximo 2 aplicações**, com um intervalo mínimo de 14 dias. **Volume de calda:** 500 a 1000 l/ha. **Intervalo de segurança:** 7 dias. ■ **OLIVEIRA** (Azeitona de mesa) **Traça-da-oliveira:** 45 ml/hl (máx: 0,45 L/ha). A partir do estado 50% das flores abertas (desde BBCH 65). **Mosca-da-azeitona:** 25 a 45 ml/hl (máx: 0,45 L/ha). Fruto 50% do tamanho, caroço a iniciar a lenhificação (BBCH >75). **Máximo 1 aplicação.** **Volume de calda:** 500 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 28 dias. ■ **PESSEGUEIRO** (inclui nectarina) Afídeos, Tripe, **Traça-oriental-do-pessegueiro** :20 ml/hl (Máx:0,2 L/ha). Desde final da floração (BBCH >69). **Máximo 1 aplicação.** **Volume de calda:** 750 a 1000 L/ha. **Intervalo de segurança:** 21 dias. ■ **VIDEIRA** (uva de mesa e uva para vinificação) **Cicadélido-da-flavescência-dourada, Cicadela-da-vinha:** 25 ml/hl (Máx: 0,25 L/ha). **Máximo 1 aplicação**, a partir da fase da emergência da inflorescência. **Volume de calda:** 200 a 1000 L/ha. Para volumes de calda de 200-300 L/ha, devem ser usados bicos de redução do arrastamento da calda. **Intervalo de segurança:** 21 dias.

INFORME-SE AQUI



 **nufarm**