

DECA

FICHA TÉCNICA

INSETICIDA PIRETRÓIDE DE CONTACTO E INGESTÃO

AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE EMERGÊNCIA Nº 2025/09

Baseada no Art.º 53 do Regulamento (CE) nº 1107/2009, para controlo de *Scirtothrips aurantii*, em plantas hospedeiras, no contexto de um plano de contingência

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

DECA está indicado para controlar as seguintes pragas nas culturas a seguir:

Culturas	Pragas	Condições de aplicação	Nº máximo de aplicações / Intervalo entre aplicações (dias)	Concentração/ Dose/ Vol. Calda	Intervalo de segurança /Intervalo de reentrada (dias)
Máximo 2 aplicações por ciclo cultural para o conjunto dos inimigos.					
Macieira Pereira Pessegueiro	Tripe-dos-citrinos da África-do-Sul (<i>Scirtothrips aurantii</i>)	Aplicar aos primeiros sinais de presença da praga, durante as fases de aparecimento e desenvolvimento das folhas, antes da floração (BBCH 10-59)	2/14	30-50 mL/hL Dose máx: 300 - 500 mL/ha Vol. Calda: 1000 L/ha	7 / -
Olival	Tripe-dos-citrinos da África-do-Sul (<i>Scirtothrips aurantii</i>)	ou após a floração (BBCH71-75)	2/14	50 mL/hL Dose máx: 125 mL/ha Vol. Calda: 1000 L/ha	7 / -

Praça de Alvalade, nº 7 - 6º Esq.
1700-036 Lisboa
Portugal

+351 217 998 440

www.nufarm.com/pt

© 2018 Nufarm Limited

