

# SEALICIT®

## KFV 6(B) NEMIKROBIÁLNÍ ROSTLINNÝ STIMULANT

Obsah:

extrakt z mořských řas (CMC2)

Návod k použití:

Plodiny	Dávkování (l/ha)	Metoda aplikace (dávka vody)	Aplikační fáze	Počet aplikací	Tvrzení o účinku
řepka olejka	1,0	postřik (200-300 l/ha)	BBCH16- BBCH55	1	zvýšení odolnosti šeuší proti praskání

Aplikujte doporučenou dávku. Výrobek je mísitelný s mnoha přípravky na ochranu rostlin. V případě směsi je uživatel povinen provést před aplikací zkoušku směsi. Výrobce pouze ručí za to, že výrobek odpovídá popisu na etiketě. Kupující a uživatel souhlasí s převzetím veškeré odpovědnosti spojené s manipulací, používáním a likvidací tohoto výrobku. Žádný zástupce ani distributor není oprávněn poskytovat jakékoliv záruky nad rámec zde uvedených.

Podmínky skladování:

Skladujte v suchu při teplotě +5 °C až +30 °C. Výrobek je stabilní při pokojové teplotě. Výrobek není hořlavý. Uchovávejte kanystr ve svislé poloze. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace o bezpečnosti a životním prostředí:

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270: Při používání toho výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

Datum výroby: uvedeno na obalu

Datum konce použitelnosti: 3 roky od data výroby

Číslo šarže: uvedeno na obalu

5 L

KAPALINA



**Brandon Bioscience, Brandon Products Ltd.,  
Centrepoint, Tralee, County Kerry, Ireland.  
www.brandonbioscience.com**

## **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:**

### **Doporučení pro aplikaci:**

Postřik výrobku SEALICIT® zlepšuje odolnost šesulí proti praskání u řepky olejky. Doporučená dávka je 1 l/ha (200-300 l/ha vody) ve fázi BBCH 16-55. Pokud je dávka vody vyšší než 300 l, měla by být použita vyšší aplikační dávka. SEALICIT® by neměl být použitý neředěný.

### **Aplikační poznámky:**

SEALICIT® lze používat po dlouhou dobu s vysokou účinností. Nejlepších výsledků je dosaženo, když je plodina suchá, jsou dobré světelné podmínky, není velká oblačnost a jsou příznivé podmínky pro růst (teplota, živiny a zásoba vody). Neaplikujte SEALICIT®, pokud se během 3-4 hodin očekává déšť. Neaplikujte SEALICIT® bezprostředně před nebo po nočních mrazech, při velmi vysokých denních teplotách a vysokých teplotních výkyvech den-noc. Aplikujte tank-mix kombinace ihned po přípravě.

### **Mísitelnost:**

Při aplikaci tank-mix kombinací je třeba dodržovat stanovené a schválené oblasti použití a aplikační předpisy pro mísičeho partnera. SEALICIT® je mísitelný s běžnými fungicidy, jako je Tyberius a insekticidy, jako je Jager. Možné jsou také směsi s regulátory růstu. Při aplikaci s DAM 390 dodržujte poměr DAM 390 k vodě 1:4, tj. 1 díl DAM 390 na min. 4 díly vody. Nepřidávejte žádné další mísičí partnery do směsi obsahující dusík. Nedoporučujeme používat směsi s fungicidy obsahujícími měď a s oleji/smácedly. Nemíchejte s nechelátovými vápenatými přípravky. Nemíchejte s vysoce kyselými roztoky nebo silnými oxidačními činidly. Je třeba se vyhnout směsím s pH nižším než 4. Neručíme za případné negativní účinky námi nedoporučených směsí.

### **Příprava postřikové kapaliny:**

Připravte pouze tolik postřikové kapaliny, kolik je skutečně potřeba, a co nejpřesněji vypočítejte potřebné množství. Zejména u větších postřikovacích nádrží je vhodné při plnění nádrže použít průtokoměr. Při přípravě postřikové kapaliny používejte vhodný ochranný oděv a vybavení!

1. Naplňte nádrž z 1/3 - 1/2 požadovaným množstvím vody.
2. Zapněte míchací zařízení.
3. Před plněním SEALICIT® důkladně protřepejte.
4. Nalijte SEALICIT® do nádrže.
5. Opatrně vypláchněte prázdnou nádrž a do postřikové kapaliny přidejte oplachovou vodu.
6. Naplňte nádrž vodou.
7. Kompletně vystríkejte postřikovou kapalinu ihned po smíchání za chodu míchacího zařízení.

### **Informace o první pomoci:**

Všeobecné informace: Za normálních podmínek použití je výrobek považován za málo nebezpečný.

**PŘI POŽITÍ:** Důkladně vypláchněte ústa vodou. Pokud jsou příznaky závažné nebo přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

**PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Opláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává i po umytí, vyhledejte lékařskou pomoc.

**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

**Ochrana pracovníků první pomoci:** Za normálních podmínek použití se nepředpokládají žádné specifické požadavky.

**Poznámky pro lékaře, pokud je nutná okamžitá lékařská pomoc a zvláštní ošetření:** Symptomatická léčba.

### **Transport, skladování a likvidace obalů a zbytků:**

**Skladování:** Skladujte v suchu při teplotě +5 °C až +30 °C. Výrobek je stabilní při pokojové teplotě. Výrobek není hořlavý. Uchovávejte kanystr ve svislé poloze. Uchovávejte mimo dosah dětí.

**Transport:** Není regulováno. Není klasifikováno jako nebezpečné zboží pro přepravu.

**Likvidace obalů a zbytků:** Nevyhazujte do domovního odpadu. Nevylévejte zbytky do umyvadla nebo toalety. Odnešte na sběrné místo nebezpečného odpadu. Vyprázdněné nádoby je třeba odevzdat do sběrného a recyklačního systému. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s národními předpisy.

**Prohlášení:**

Uvedené informace odpovídají současnému stavu našich znalostí a mají poskytnout informace o výrobku a jeho možném použití. Při dodržení návodu k použití je výrobek vhodný pro doporučené účely. Garantujeme, že složení výrobku v uzavřených originálních obalech odpovídá údajům uvedeným na etiketě. Protože skladování a používání rostlinného biostimulantu je mimo naši kontrolu, neneseme odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé důsledky vyplývající z nesprávného použití výrobku nebo použití v rozporu s pokyny. Různé faktory, jak místní, tak regionální, jako jsou povětrnostní a půdní podmínky, odrůdy rostlin, datum aplikace, aplikační technika, rezistence, směsi s jinými produkty atd. mohou ovlivnit účinek výrobku. Nepříznivé podmínky mohou mít za následek změnu účinnosti výrobku nebo nelze vyloučit poškození plodiny. Distributor nebo výrobce nenesou odpovědnost za takové následky. Veškerá vlastnická práva, stávající zákony a předpisy, jakož i ustanovení o schválení výrobku a informace o výrobku musí uživatel dodržovat na vlastní odpovědnost. Všechna data a informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit.

**Registrovaná ochranná známka**

SEALICIT® = registrovaná ochranná známka firmy Brandon Products Ltd.

**Výrobce:** Brandon Bioscience, Brandon Products Ltd., Centrepoint, Tralee, County Kerry, Ireland.  
[www.brandonbioscience.com](http://www.brandonbioscience.com)

**Distribuce:** Nufarm Hungária Kft., odštěpný závod, se sídlem v Praze, Jindřišská 937/16,  
110 00 Praha 1, Česká republika. [www.nufarm.com](http://www.nufarm.com)