

Kaiso 50 EG

Insekticīds

Pieskares iedarbības insekticīds kaitēkļu ierobežošanai kartupeļu stādījumos, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, ziemas tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu, vasaras tritikāles, ziemas rapša un vasaras rapša sējumos.

Preparatīvā forma : emulgējošas granulas

Darbīgā viela: lambda – cihalotrīns 50 g/kg

Reģistrācijas Nr.: 0381

Reģistrācijas klase: 2

Iepakojums: 0.6 kg, 3 kg, 6 kg



BĪSTAMI

H302 Kaitīgs, ja norij.

H315 Kairina ādu.

H 319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H331 Toksisks ieelpojot.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību.

P261 Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus.

P301+ P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

P330 Izskalot muti.

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu.

P305+ P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja tiek lietotas 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, nepieciešams ievērot 10 m aizsargjoslu, un, ja tiek lietotas 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas nepieciešams ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus kukaiņus/posmkājus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Aizsargjosla līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei nav jāievēro, ja lieto 75 % smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

60 % maisījuma veido sastāvdaļas, par kuru toksicitāti nav ziņu (inhalatīvais toksiskums).

Smidzinot augu aizsardzības līdzekli laukā, kas robežojas ar teritorijām, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas, nepieciešams ievērot 2 m aizsargjoslu no lauka malas.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

Uzglabāšana: Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

Derīguma termiņš: 3 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

Partijas numurs/izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Nufarm GmbH&Co KG,
St.-Peter-Strasse 25,
A-4021 Linz,
Austrija

Ražotājs:

Sulphur Mills Limited
Shed No. A-18/18, 1904, 1905, 1928/29/30, G.I.D.C., Panoli
394116, Ankleshwar, Bharuch - Gujarat
Indija

Tehniskā konsultācija Latvijā: 25549549, 27734868

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens un nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Simptomātiskā ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, aizsargbrilles, respiratoru, ķīmiski izturīgus cimdus un slēgtus apavus. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

PREPARĀTA APRAKSTS

Kaiso 50 EG – sintētisko piretroīdu grupas pieskares un zarnu iedarbības insekticīds.

To lieto grauzējtipa un sūcējtipa kaitēkļu iznīcināšanai ziemas kviešos un vasaras kviešos, rudzos, ziemas tritikālē un vasaras tritikālē, ziemas miežos un vasaras miežos, ziemas un vasaras rapsī un kartupeļos.

Insekticīds iedarbojas pieskares ceļā, nokļūstot uz kukaiņa, kā arī caur kukaiņa barības traktu. Pēc tiešas insekticīda saskares ar kaitēkli, kā arī apstrādātu augu nonākšanas barības traktā, preparāts ātri iedarbojas uz kukaiņu nervu sistēmu, izsaucot kaitēkļu bojā eju. Pirmie iedarbības rezultāti redzami ļoti ātri, bet pilnībā kukaiņi aiziet bojā pēc 1-3 stundām.

LIETOŠANA

Apstrādājamā kultūra	Kaitīgais organisms	Deva, kg/ha	Ieteicamā darba šķidruma konc., %	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienas	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Kartupeļi	Laputis (<i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis nasturtii</i> , <i>Aphis frangulae</i>), kartupeļu lapgrauzis (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	14	1
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži rudzi, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Laputis (<i>Aphididae</i>), labību lapgrauži (<i>Oulema melanopus</i> , <i>Oulema lichenis</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	35	1
Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Smecernieki (<i>Ceutorhynchus assimilis</i> , <i>C.napi</i> , <i>C.quadridentatus</i>), krustziežu pāksteņu pangodiņš (<i>Dasyneurea brassicae</i>), krustziežu spīdulis (<i>Meligethes aeneus</i>)	0.15		Apsmidzināt, kaitēklim parādoties	28	1

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: viena reize.

IETEICAMĀIS ŪDENS DAUDZUMS

200 – 400 l/ha

METEOROLOĢISKIE PRIEKŠNOSACĪJUMI SMIDZINĀŠANAS LAIKĀ

Neizsmidzināt, kad temperatūra augstāka par +25°C. Pēc smidzināšanas jāpaiet 1-2 stundām līdz lietum.

BITES

Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.

„Vietas, kur bites aktīvi meklē barību” ietver arī gadījumus, kad ir novērojama jebkāda aktīva bišu darbība apstrādājamajā platībā, piemēram, kad novērojama bišu pārlidošana uz blakus esošu teritoriju barības ievākšanai.

AIZSARGJOLA LĪDZ ŪDENSTILPĒM UN ŪDENSTECĒM

Kultūraugs	Deva, L/ha	Smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas			
		Netiek lietotas	50 %	75 %	90 %
Kultūraugu sējumi un stādījumi	0.15	30 m	15 m	10 m	10 m

AR LIETOJUMU NESAISTĪTI POSMKĀJI/KUKAIŅI

La aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, jāievēro sekojoši ierobežojumi Kaiso 50 EG lietošanā.

Aizsargjosla līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Kultūraugs	Deva, L/ha	Smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas			
		Netiek lietotas	50 %	75 %	90 %
Kultūraugu sējumi un stādījumi	0.15	5 m	5 m	0 m	0 m

REZISTENCES IEROBEŽOŠANAS STRATĒGIJA

Krustziežu spīdulum iespējama rezistences veidošanās pret piretroīdu grupas insekticīdiem, tai skaitā Kaiso 50 EG. Rezistences izveidošanās rezultātā var ievērojami samazināties piretroīdu grupas insekticīdu efektivitāte.

Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, lietojot Kaiso 50 EG jāievēro šādi ieteikumi:

- lietot tikai reģistrēto devu, nelietot zemākas devas, kā ieteikts lietojumā;
- nesmidzināt atkārtoti insekticīdus no piretroīdu grupas augsta riska kaitēkļu (piem. krustziežu spīdumu) ierobežošanai tajā pašā sezonā;
- ja nepieciešams veikt atkārtotu apstrādi, lietot insekticīdus no citām ķīmisko vielu grupām.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta izmantošanas tukšais iepakojums 3 reizes jāizskalo ar tīru ūdeni, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Ja tiek lietotas 75% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas, nepieciešams ievērot 10 m aizsargjoslu, un, ja tiek lietotas 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas nepieciešams ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt tikai oriģinālā iepakojumā. Iepakojumu uzglabāt cieši aizvērtā veidā, sausā, vēsā un labi vēdināmā noliktavā. Uzglabāt bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā, atsevišķi no pārtikas produktiem un lopbarības.

DERĪGUMA TERMIŅŠ: 3 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu augu aizsardzības līdzekļu augsto kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza lietošana vai uzglabāšana. Produkts paredzēts lietošanai saskaņā ar marķējumā aprakstītajām rekomendācijām un instrukcijām, kuras pievienotas šim iepakojumam. Lietošana kādos citos apstākļos ir pilnībā uz lietotāja riska.