

CUPROXAT®

كوبروكسات®

سلفات النحاس ٣٤٥ غرام/لتر و/ح
Tribasic Copper Sulfate 345 g/L w/v
نحاس ١٩٠ غرام/لتر و/ح Copper 190 g/L w/v

مواد أخرى ٦٥٥ غرام/لتر
Other Ingredients 655 g/L
مركز معلق SC

مبيد فطري نحاسي يعمل بالملامسة لمكافحة الأمراض الفطرية
و البكتيرية التي تصيب العديد من المحاصيل الزراعية

يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال



الشركة المنتجة: نوفارم - النمسا

يونيفر ش.م.ل.

الشركة المستوردة و الموزعة: يونيفر ش.م.ل.
شارع بربر أبو جودة-البوشيرة
تلفون: ٠١/ ٨٩٧٧٦٣

Batch number:
Production date:
Expiry date:

رقم الارسالية:
تاريخ الصنع:
تاريخ انتهاء الصلاحية:

المحتوى الصافي: ٥ لتر

500001135_092022

Toxic



سام



المحصول	المرض	نسبة الاستعمال	فترة الأمان
التفاحيات، الإجاص و الإسفرجل	الامراض البكتيرية، التبقع البني و تبقع الأوراق <i>Venturia inaequalis</i> (الخراب)	١٢٥ مل/ ١٠٠ لتر (نمو نباتي) ٢٥٠ مل/ ١٠٠ لتر (حطب وقبل الإزهار)	٢١ يوم
الدراق و المشمش	الامراض البكتيرية و مرض تجعد الأوراق <i>Taphrina spp</i>	١٢٥ مل/ ١٠٠ لتر (نمو نباتي) ٢٥٠ مل/ ١٠٠ لتر (حطب وقبل الإزهار)	٢١ يوم
الخوخ و الكرز	الامراض البكتيرية و مرض تجعد الأوراق	٢٥٠ مل/ ١٠٠ لتر	على الحطب وقبل الإزهار
الزيتون	مرض عين الطاووس و سل الزيتون	٣٠٠-٤٠٠ مل/ ١٠٠ لتر	١٤ يوم
الحمضيات	الامراض البكتيرية و اللثة المتأخرة	٣٠٠-٤٠٠ مل/ ١٠٠ لتر	١٤ يوم
الكوي	الامراض البكتيرية و اللثة المتأخرة	٢٥٠ مل/ ١٠٠ لتر	على الحطب
العنب	البياض الزغبي	٢,٥-٤ لتر/ هكتار	٢١ يوم
البندورة و الباذنجان	اللثة المبكرة (الالتيرناريا)، الامراض البكتيرية، الأنتراكنوز و اللثة المتأخرة <i>Phytophthora infestans</i>	٢,٦-٣,٥ لتر/ هكتار	١٠ أيام
الفرعيات(خيار-كوسا)	اللثة المبكرة (الالتيرناريا)، الامراض البكتيرية، الأنتراكنوز و البياض الزغبي	٢,٦-٥,٣ لتر/ هكتار	٣ أيام
الثوم، الكراث و البصل	اللثة المبكرة (الالتيرناريا)، الامراض البكتيرية، الأنتراكنوز و البياض الزغبي	٢,٦-٥,٣ لتر/ هكتار	٣ أيام
البروكولي	البياض الزغبي	٢,٦-٥,٣ لتر/ هكتار	١٤ يوم
القرنبيط	الامراض البكتيرية و البياض الزغبي	٢,٦-٤,٦ لتر/ هكتار	١٤ يوم
الأرضي شوكي	الامراض البكتيرية و البياض الزغبي	٢,٦-٥,٣ لتر/ هكتار	٣ أيام
الخس	اللثة المبكرة (الالتيرناريا)، الأنتراكنوز و البياض الزغبي	٢,٦-٥,٣ لتر/ هكتار	٧ أيام
الورد	الانتراكنوز	٢,٦-٤,٦ لتر/ هكتار	-
الصنوبريات	اللثة المتأخرة <i>Phytophthora spp</i>	٢,٦-٤,٦ لتر/ هكتار	-
نباتات الزينة	البياض الزغبي	٢,٦-٤,٦ لتر/ هكتار	-

قابلية المزج: قابل للمزج مع معظم المبيدات الزراعية لكن يفضل عدم رشه مع الكلوربيريفوس.

الإسعافات الأولية: إبعاد المصاب عن مصدر التعرض للمبيد و استدعاء الطبيب فوراً.

في حال تنشق المبيد ينقل المصاب إلى الهواء الطلق. في حال ملامسة المبيد للجلد، يتم نزع الثياب الملوثة و غسل البشرة جيداً. في حال ملامسة المبيد للعين، تغسل جيداً لمدة ١٥ دقيقة. في حال ابتلاع المبيد يعطى المصاب ملعقة من Potassium Hexacyanoferrat 1% و يجب عدم إحداث التقيؤ.

ترياق مضاد: لا يوجد.

التخلص من العبوات الفارغة: يجب غسل العبوات الفارغة ثلاث مرات بالماء و إعادة مياه الغسيل إلى خزان الرش و تقبها و حفظها في مكان آمن بعيداً عن مصادر المياه.

المسؤولية القانونية: إن المنتج و الموزع يضمنان جودة المادة لكن طالما ليس لهما أي إشراف على استعمال أو تخزين هذا المبيد فإنهما لا يتحملان أي مسؤولية قد تنتج عن سوء الاستعمال.

فترة الانتظار قبل دخول الحقل: يمكن دخول الحقل فوراً بعد جفاف محلول الرش.
توصيات عامة:

١- ضغط 40PSI أو 2.76Bar.

٢- رذاذ حجم القطرة 200 - 400 ميكرون.

٣- لانس مفتوح ناعم.

٤- معدل رش الهكتار حوالي 1000 لتر، و قد يزيد أو ينقص حسب حجم الأوراق.

التأثير على البيئة: سام جداً للنحل و للأسماك. متوسط السمية للطيور .

درجة السمية: WHO Ib حسب منظمة الصحة العالمية.

إحتياطات السلامة: يجب اتخاذ الإحتياطات اللازمة عند رش المبيد مثل ارتداء الملابس الواقية و غسل اليدين بعد عملية الرش. يجب عدم التدخين، الشرب و الأكل أثناء الرش و عدم تنشق المبيد أو رذاذ الرش و تجنب ملامسة المبيد للجسم أو العين.

عبارات تحذيرية: عدم الرش عند هبوب الريح.

الاستعمال الصحيح للمبيد: يملأ خزان الرش بثلث إلى ربع كمية المياه و من ثم توضع كمية المبيد المستعملة مع التحريك المستمر و يملأ خزان الرش بالكمية المتبقية من المياه.

510011526_092022

Toxic



سام

