

ACTLET C

FUNGICID

produs de Ascenza Agro S.A

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare
nr. 25-06-18-03-1926 din 18-06-2025



CULTURA:

**VIȚĂ DE VIE, CARTOF,
TOMATE, VINETE**

CONȚINE:

28,5 G/L METALAXIL-M

215 G/L HIDROXID DE CUPRU

TIMP DE PAUZĂ:



3-28 ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

CONCENTRAT SOLUBIL
(SL)



TERMEN DE VALABILITATE:



MOD DE ACȚIUNE

ACTLET C este un fungicid sistemic și de contact pe bază de 28,5 g/l metalaxil-m și 215 g/l hidroxid de cupru cu triplă acțiune: preventivă, curativă și antisporulantă. Metalaxil-M este sistemic și este preluat rapid de părțile verzi ale plantelor, distribuit ascendent (acropetal) în toată planta și în noile creșteri apărute după tratament. Metalaxil-M are și activitate curativă, inhibă creșterea miceliului și producerea sporilor.

Hidroxidul de cupru are acțiune preventivă asupra plantelor, precum și activitate secundară bactericidă.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRĂTĂRI
VIȚĂ DE VIE	Mană (<i>Plasmopara viticola</i>) Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 71-83	3,5	28 / (2)
TOMATE, VINETE (SPAȚII PROTEJATE)	Mană (<i>Phytophthora infestans</i>) Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 29-81	3,5	3 / (3)
TOMATE, VINETE	Mană (<i>Phytophthora infestans</i>) Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 29-81	3,5	10 / (3)
CARTOF	Mană (<i>Phytophthora infestans</i>) Prin stropire în perioada de vegetație, BBCH 36-81	3,5	21 / (3)



ACTLET C®

Tratamentele se aplică preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor.

- La **vița de vie**, tratamentele se aplică la interval de 12- 14 zile, de la începutul dezvoltării boabelor până când numărul boabelor colorate crește (BBCH 71-83).
- La **cartof**, tratamentele se aplică la interval de 7-10 zile, de la fenofaza când 60% din plante acoperă intervalul dintre rânduri până la fenofaza când bacele în prima fructificare sunt încă verzi (BBCH 36-81).
- La **tomate și vinete**, tratamentele se aplică la interval de 7-10 zile, de la apariția a 9 sau mai multor lăstari laterali până la începutul maturării fructelor (BBCH 29-81).

TEHNICA DE APLICARE

Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de stropit este de 500 -1000 l/ha.

Volumul de apă se stabilește în funcție de stadiul de vegetație al culturii, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit.

Folosiți un volum de apă suficient pentru a asigura o bună acoperire a plantelor, păstrând doza/hectar nemodificată, indiferent de volumul de apă utilizat.

Prevenirea apariției fenomenului de rezistență

Pentru a evita dezvoltarea rezistenței, nu aplicați mai mult de 4 tratamente pe sezon cu produse din grupa fenilamide. Alternați utilizarea acestui produs cu fungicide cu moduri de acțiune diferite.

PREPARAREA AMESTECULUI

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea.

Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

COMPATIBILITATE

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici.

Consultați tabelele de compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. În cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu și instrucțiunile de folosire a produsului partener.