

CORDOBA

INSECTICID

produs de Ascenza Agro S.A

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 21-12-22-01-1035 din 22-12-2021



CULTURA:

MULTIPLE

CONȚINE:

100

 G/L LAMBDA-CIHALOTRIN

TIMP DE PAUZĂ:



3 - 60 ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

CONTACT



FORMULARE:

CAPSULE ÎN SUSPENSIE (CS)



TERMEN DE VALABILITATE:



MOD DE ACȚIUNE

CORDOBA este un insecticid piretroid care acționează prin contact și ingestie asupra unei game largi de dăunători. După aplicare substanța activă lambda-cihalotrin penetrează rapid cuticula insectei acționând asupra sistemului nervos al dăunătorilor.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
ARDEI	Musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,15 - 0,2	3 / (1)
CARTOF	Gândacul din Colorado (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,15 - 0,2	7 / (2)
CARTOF	Buha semănăturilor (<i>Agrotis segetum</i>)	0,075	7 / (1)
FASOLE	Musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,15 - 0,2	7 / (1)
GRÂU, ORZ, OVĂZ	Afide (<i>Aphididae</i>)	0,075	28 / (1)
MĂR	Păduchele verde al mărului (<i>Aphis pomi</i>) Păduchele verde al piersicului (<i>Myzus persicae</i>)	0,1	7 / (1)
MĂR	Musca mediteraneană a fructelor (<i>Ceratitis capitata</i>)	0,125	7 / (2)
MĂR	Viermele merelor (<i>Cydia pomonella</i>)	0,075 - 0,1	7 / (2)



CORDOBA®

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
PIERSIC, NECTARIN, PRUN, CAIS	Musca mediteraneană a fructelor (<i>Ceratitis capitata</i>)	0,125	7 / (2)
PORUMB	Sfredelitorul porumbului (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	0,2	60 / (1)
PORUMB	Buha semănăturilor (<i>Agrotis segetum</i>)	0,075	60 / (1)
PĂR	Viermele merelor (<i>Cydia pomonella</i>)	0,075 - 0,1	7 / (2)
PĂR	Musca mediteraneană a fructelor (<i>Ceratitis capitata</i>)	0,125	7 / (2)
PĂR	Afide (<i>Aphididae</i>)	0,1	7 / (1)
PĂR	Puricele melifer al părului (<i>Cacopsylla pyri</i>)	0,2 - 0,3	7 / (2)
SALATĂ	Afide (<i>Aphididae</i>)	0,125	7 / (2)
SFECLA DE ZAHĂR	Afide (<i>Aphididae</i>)	0,15	7 / (1)
TOMATE	Buha fructificațiilor (<i>Helicoverpa armigera</i>)	0,2 - 0,25	3 / (2)
TOMATE	Musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Musculița albă a tutunului (<i>Bemisia tabaci</i>)	0,15 - 0,2	3 / (2)
TOMATE	Buha semănăturilor (<i>Agrotis segetum</i>)	0,075	3 / (1)
VARZĂ, VARZĂ DE BRUXELLES, BROCCOLI ȘI CONOPIDĂ	Albilită (<i>Pieris spp.</i>) Buha legumelor (<i>Autographa gamma</i>) Buha semănăturilor (<i>Agrotis segetum</i>)	0,075	10 / (1)
VARZĂ, VARZĂ DE BRUXELLES, BROCCOLI ȘI CONOPIDĂ	Musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Musculița albă a tutunului (<i>Bemisia tabaci</i>)	0,15 - 0,2	10 / (1)
VIȚA DE VIE	Molia verde a strugurilor (<i>Lobesia botrana</i>)	0,175	7 / (1)
VIȚA DE VIE	Musca mediteraneană a fructelor (<i>Ceratitis capitata</i>)	0,125	7 / (2)
VIȚA DE VIE	Molia viței de vie (<i>Sparganothis pilleriana</i>)	0,075	7 / (1)

Produsul se aplică prin stropire în perioada de vegetație. Calibrați corect echipamentul pentru asigurarea unui tratament uniform. Volumul de apă se stabilește în funcție de stadiul de vegetație al culturii, astfel încât să se asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit. Volumul maxim de soluție este de 1000 litri/ha.

COMPATIBILITATE

Nu aplicați acest produs sau alt insecticid piretroid mai mult de 2 ori pe sezon. Se recomandă să se alterneze utilizarea acestui produs cu insecticide cu moduri de acțiune diferite.