

# ESTET

## ERBICID

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 22-07-07-03-1119 din 07-07-2022



### CULTURA:

**PORUMB, GRÂU  
ȘI ORZ**

### CONȚINE:

**905** G/L 2,4-D  
(2-ESTER ETIL HEXILIC)

### TIMP DE PAUZĂ:



### MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC

### FORMULARE:

CONCENTRAT SOLUBIL  
(SL)



### TERMEN DE VALABILITATE:



## MOD DE ACȚIUNE

**Estet** este un erbicid sistemic ce se absoarbe prin frunze și parțial prin rădăcini și se translocă în întreaga plantă. Erbicidul determină o creștere anormală a celulelor, dereglând echilibrul între sinteza și consumul de substanțe nutritive, provocând în acest mod moartea buruienilor prin epuizarea rezervelor.

Viteza de translocare a erbicidului este în funcție de doza aplicată, talia buruienilor și, în mod special, de condițiile climatice (umiditate, temperatură) înainte și după tratament.

## RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRĂTĂRI
<b>PORUMB</b>	<b>Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene</b> Prin stropirea seminăturilor în faza de 3-5 frunze ale culturii	0,7 - 0,8	- / (1)
<b>GRÂU ȘI ORZ</b>	<b>Buruieni dicotiledonate anuale și unele perene</b> Prin stropirea seminăturilor în faza de înfrățire a culturii	0,7 - 0,8	- / (1)

## TEHNICA DE APLICARE

**Estet** este un erbicid recomandat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene, sensibile la 2,4 D din culturile de grâu și orz. Se aplică după stadiul de 2 frunze până la formarea primului internod.

La culturile de porumb, tratamentul se face când buruienile sunt în fază de 2 – 4 frunze, iar plantele de porumb au dezvoltate 4 – 6 frunze.

Cantitatea de soluție recomandată a se aplica pe suprafața de un ha este de 200 – 300 litri. Umpleți rezervorul pe jumătate cu apă, adăugați cantitatea necesară de Estet și agitați. Se umple rezervorul cu apă, continuându-se agitarea.

Soluția trebuie aplicată în ziua în care este pregătită, nu se păstrează pentru ziua următoare.

Aplicarea tratamentului se poate realiza cu echipamente terestre, ținându-se cont ca tratamentele să se realizeze pe vreme liniștită, în scopul evitării driftului pentru culturile învecinate, sensibile.

