

FOLPEC

FUNGICID

produs de Ascenza Agro S.A

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 24-12-03-02-1720 din 03-12-2024



CULTURA:

ORZ, GRÂU

CONȚINE:

500

 G/L FOLPET

TIMP DE PAUZĂ:



42 ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

CONTACT



TERMEN DE VALABILITATE:

FORMULARE:

SUSPENSIIE CONCENTRATĂ (SC)



MOD DE ACȚIUNE

Folpec este un fungicid cu acțiune de contact care are un efect protector împotriva Septoriozei la grâu și a Pătării reticulare a frunzelor de orz.

Folpet aparține clasei chimice a ftalimidelor și inhibă germinarea sporilor fungici și blochează creșterea miceliului fungic, prin acțiune de contact multi-site la nivel subcelular (inhibă respirația, ceea ce duce la inhibarea diviziunii celulare).

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
ORZ DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ	Pătarea reticulară a frunzelor (<i>Pyrenophora teres</i>) Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-59)	1,2	42 / (2)
	GRÂU DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ	Septorioza (<i>Septoria tritici</i>) Prin stropire în perioada de vegetație (BBCH 30-59)	1,2
GRÂU DURUM DE TOAMNĂ ȘI DE PRIMĂVARĂ			



Tratamentele se aplică preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor.

• **La Grâu de toamnă și de primăvară; Grâu durum de toamnă și de primăvară -** Pulverizare foliară preventivă (în cazul în care condițiile meteorologice sunt favorabile dezvoltării bolii). De la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul apariției inflorescenței, adică formarea sa completă (BBCH 30-59).

1,2 L/ha doza maximă per aplicare

2,4 L/ha doza totală maximă pe cultură/sezon

Apă 150-300 L/ha

• **La Orz de toamnă și de primăvară -** Pulverizare foliară preventivă (în cazul în care condițiile meteorologice sunt favorabile dezvoltării bolii). De la începutul alungirii tulpinii până la sfârșitul apariției inflorescenței, adică formarea sa completă (BBCH 30-59).

1,2 L/ha doza maximă per aplicare

2,4 L/ha doza totală maximă pe cultură/sezon

Apă 200-300 L/ha

Observații:

1. Doza este proporțională cu severitatea infestării. În caz de infestare cu severitate scăzută se va folosi doza minimă și în caz de infestare cu severitate ridicată se va folosi doza maximă.

2. Utilizarea în grâu include alac și triticale.

TEHNICA DE APLICARE

Umpleți rezervorul de pulverizare cu apă până la jumătate din capacitatea sa. Adăugați cantitatea recomandată de produs, amestecând bine. Apoi adăugați restul de apă și amestecați în continuare.

COMPATIBILITATE

Incompatibilitate cu produse pe bază de ulei și produse alcaline având risc de fitotoxicitate.

Nu aplicăm după înflorit.

