

MEDEIRO F

FUNGICID

produs de Ascenza Agro S.A

Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 24-08-08-02-1645 din 08.08.2024



CULTURA:

VIȚĂ DE VIE

CONȚINE:

500 G/KG FOSETIL DE ALUMINIU
250 G/KG FOLPET

TIMP DE PAUZĂ:



42 ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



FORMULARE:

GRANULE DISPERSABILE
ÎN APĂ (WG)



TERMEN DE VALABILITATE:



MOD DE ACȚIUNE

Medeiro F are o acțiune preventivă excelentă asupra ciupercilor patogene, împiedicând germinarea sporilor și creșterea miceliului. Fosetilul de aluminiu este o substanță activă care prezintă sistemie completă ascendentă și descendentă. Prin modul de acțiune multisite și de stimulare a sistemului de autoapărare al plantei, fosetilul de aluminiu împiedică dezvoltarea fenomenului de rezistență. Folpetul, substanță cu acțiune de contact, asigură o protecție imediată, înainte ca activitatea sistemică a fosetilului de aluminiu să se producă. Prin acest mecanism complex de acțiune, **Medeiro F** asigură protecția față de mană în momentele de sensibilitate maximă ale viței-de-vie.

- **Folpet:** fungicid de contact care acționează asupra mai multor mecanisme celulare ale ciupercilor (acțiune „multi-site”). Adicional caracteristicilor excelente de prevenție la nivelul frunzei, are și un efect stimulator asupra vegetației, asociat cu o activitate fotosintetică crescută. De asemenea, prezintă o acțiune secundară asupra Botrytis și făinării.
- **Fosetil de aluminiu:** fungicid care are și proprietatea de stimulare a sistemelor de autoapărare ale plantei, cu o sistemicitate completă ascendentă și descendentă, protejează foarte bine țesuturile nou formate între două tratamente. Fiind, în esență, un fungicid preventiv, are o acțiune curativă de la 2 la 3 zile după începerea infecției.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA KG/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRĂTĂRI
VIȚA DE VIE	Mană (<i>Plasmopara viticola</i>)	3	42 / (3)



MEDEIRO F®

Produsul se aplică preventiv, la avertizare, când condițiile climatice sunt favorabile apariției manei.

Se aplică 3 kg/ha în condițiile unei presiuni normale de infecție. Doza de 4 kg/ha se utilizează doar în cazul unei presiuni ridicate de infecție.

Intervalul dintre două aplicări succesive este de 10–14 zile, în funcție de condițiile climatice și de presiunea de infecție.

Pentru strugurii de masă, ultimul tratament se aplică la stadiul BBCH 69 (sfârșitul înfloritului).

Numărul maxim de tratamente cu **Medeiro F** este de 3 pe sezon.

AVANTAJE

- Două substanțe active cu acțiune de contact și sistemică
- Potrivit pentru aplicații în perioada de creștere vegetativă intensă, protejând creșterile nou formate
- Protejează toate organele plantei
- Simplu și de încredere, cu o fereastră largă de aplicare (aproape tot sezonul)
- Ideal în programele de protecție integrată

Medeiro F este un fungicid pentru combaterea manei viței-de-vie, cu acțiune preventivă, având sistemicitate completă (translocare ascendentă și descendentă).

Medeiro F garantează o protecție completă a întregii plante, inclusiv a părților nou formate între tratamente.

- Acționează prin stimularea mecanismelor naturale de apărare. Cu absorbție rapidă, la 30 de minute după aplicare, asigură rezistență la spălare.
- Persistență ridicată a acțiunii (12–14 zile), chiar și în stadii mai avansate de vegetație.
- Formulată în granule dispersabile în apă (WG), permițând o mai mare ușurință de utilizare și siguranță.

TEHNICA DE APLICARE

Volumul de apă recomandat pentru prepararea soluției de stropit este de 200–800 l/ha.

Se va utiliza un volum de soluție corespunzător stadiului de vegetație al culturii, care să asigure o bună acoperire a foliajului cu soluția de stropit, evitându-se însă șiroirea.

COMPATIBILITATE

Produsul **nu** este compatibil cu produsele pe bază de cupru și nici cu îngrășămintele foliare, în special cele azotoase.

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici.