

MYSTIC EW

FUNGICID



Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare nr. 19-08-14-02-0593 din 14-08-2019

CULTURA:

**VIȚĂ DE VIE, MĂR,
GRĂU, RAPIȚĂ**

CONȚINE:

250 G/L TEBUCONAZOL

TIMP DE PAUZĂ:



14 - 50 ZILE

MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



TERMEN DE VALABILITATE:

FORMULARE:

EMULSIE DE ULEI ÎN APĂ
(EW)



MOD DE ACȚIUNE

Mystic EW este un fungicid sistemic cu spectru larg de acțiune, în special asupra agenților patogeni care provoacă făinări la culturile de grâu, rapiță, măr și viță de vie.

- **Mystic EW** are acțiune preventivă, curativă și uneori de eradicare, care se manifestă asupra patogenilor prin inhibarea sintezei ergosterolului, un component al membranelor celulare ale organismelor țintă.
- Utilizat în tratamente foliare, produsul este rapid absorbit de plantă și circulă ascendent prin sistemul circulator, protejând frunzele și creșterile noi.
- Are o bună acțiune reziduală care se manifestă pentru o perioadă îndelungată, în funcție de cultură și de condițiile locale.

Mystic EW este un fungicid formulat ca emulsie de ulei în apă și se prezintă sub forma unui lichid limpede, omogen, de culoare galben-pai, ce conține 250 g/l tebuconazol.

Este un produs cu:

- Translocare acropetală ce protejează creșterile noi;
- Efect preventiv și curativ;
- Acțiune reziduală îndelungată.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:

CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
MĂR	Făinäre (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,5 - 0,6	30 / (2-3)
VIȚĂ DE VIE	Făinäre (<i>Uncinula necato</i>)	0,4 - 0,5	14 / (2-3)



CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
GRÂU	Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>) Septorioză (<i>Septoria tritici</i>) Fuzarioză (<i>Septoria tritici</i>) Rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>)	0,75 - 1	35 / (1-2)
RAPIȚĂ	Alternarioză (<i>Alternaria brassicae</i>) Putregai alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Fomoză (<i>Phoma lingam</i>)	1	50 / (2)
RAPIȚĂ	Retardant**	0,4 - 0,5	- / (1)

** prin stropire toamna în faza de 4-6 frunze ale culturii

Fungicidul **Mystic EW** se aplică prin stropiri în timpul vegetației, la avertizare, sau la apariția primelor simptome de boală.

- Tratamentele se pot repeta la un interval minim de 14 zile la grâu, rapiță, măr și viță de vie.
- Pentru a preveni instalarea rezistenței patogenilor, se recomandă alternarea tratamentelor cu alte fungicide sistemice, având alt mod de acțiune, sau cu fungicide de contact, în funcție de programul de combatere adoptat.
- Se folosesc volume normale de soluție la hectar.

Mystic EW poate fi compatibil cu multe dintre insecticidele și fungicidele folosite în mod curent, cu excepția produselor cu reacție puternic alcalină.

Pentru o folosire corectă, consultați tabelele de compatibilitate și efectuați un test înainte de utilizare.

