



CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
<b>ZUCCHINI (CÂMP DESCHIS ȘI SPAȚII PROTEJATE)</b>	<b>Tripsul californian</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) <b>Buha fructificațiilor</b> ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) <b>Buhe</b> ( <i>Spodoptera spp.</i> ) <b>Buha gamma</b> ( <i>Autographa gamma</i> )	0,25	3 / (3)
<b>FASOLE (CÂMP DESCHIS ȘI SPAȚII PROTEJATE)</b>	<b>Molia păstăilor de soie</b> ( <i>Etiella zinckenella</i> ) <b>Tripși</b> ( <i>Thrips spp.</i> )	0,25	7 / (3)
<b>PEPENE VERDE (CÂMP DESCHIS ȘI SPAȚII PROTEJATE)</b>	<b>Buha fructificațiilor</b> ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) <b>Buhe</b> ( <i>Spodoptera spp.</i> ) <b>Buha gamma</b> ( <i>Autographa gamma</i> )	0,25	3 / (3)
<b>VIȚA DE VIE (SOIURI TEHNICE)</b>	<b>Molia verde a strugurilor</b> ( <i>Lobesia botrana</i> )	0,125	47 / (2)
<b>CAIS</b>	<b>Molia orientală a fructelor</b> ( <i>Grapholitha molesta</i> ) <b>Tripși</b> ( <i>Thrips spp.</i> )	0,25	14 / (2)
<b>TOMATE (CÂMP DESCHIS ȘI SPAȚII PROTEJATE)</b>	<b>Tripsul californian</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) <b>Cotarul tomatelor</b> ( <i>Chrysodeixis chalcites</i> ) <b>Molia minieră a tomatelor</b> ( <i>Tuta absoluta</i> ) <b>Buha fructificațiilor</b> ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) <b>Buhe</b> ( <i>Spodoptera spp.</i> )	0,25	14 / (3)
<b>PIERSIC, NECTARIN</b>	<b>Tripsul californian</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) <b>Molia orientală a fructelor</b> ( <i>Grapholitha molesta</i> ) <b>Tripsul tutunului</b> ( <i>Thrips tabaci</i> ) <b>Molia vărgată a fructelor</b> ( <i>Anarsia lineatella</i> )	0,25	14 / (2)
<b>CARTOF</b>	<b>Gândacul din Colorado</b> ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	0,075	14 / (3)
<b>CĂPȘUN</b>	<b>Tripsul californian</b> ( <i>Frankliniella occidentalis</i> ) <b>Buhe</b> ( <i>Agrotis spp., Spodoptera spp.</i> )	0,25	1 / (3)
<b>SALATE</b>	<b>Cotarul tomatelor</b> ( <i>Chrysodeixis chalcites</i> ) <b>Buha fructificațiilor</b> ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) <b>Buhe</b> ( <i>Agrotis spp., Spodoptera spp.</i> ) <b>Buha gamma</b> ( <i>Autographa gamma</i> ) <b>Tripși</b> ( <i>Thrips spp.</i> )	0,25	3 / (3)
<b>VIȚA DE VIE (SOIURI TEHNICE)</b>	<b>Purici</b> ( <i>Altica spp.</i> ) <b>Tripși</b> ( <i>Thrips spp.</i> ) <b>Molia viței de vie</b> ( <i>Sparganothis pilleriana</i> )	0,125	47 / (3)
<b>MĂR, PĂR</b>	<b>Viermele merelor</b> ( <i>Cydia pomonella</i> )	0,25	7 / (1)
<b>BROCCOLI</b>	<b>Buha verzii</b> ( <i>Mamestra brassicae</i> ) <b>Albiițe</b> ( <i>Pieris spp.</i> ) <b>Buha fructificațiilor</b> ( <i>Helicoverpa armigera</i> ) <b>Buhe</b> ( <i>Agrotis spp., Spodoptera spp.</i> )	0,2	3 / (3)

### Recomandări de aplicare

Se aplică la avertizare, în perioada de vegetație, în spații deschise sau protejate (sere, solarii).

## AVANTAJE

- Produs biologic, sigur pentru mediu
- Eficiență comparabilă cu insecticidele chimice
- Efect rapid și rezidual îndelungat, până la 3 săptămâni
- Adecvat pentru agricultura ecologică
- Nu este spălat de ploaie după 2 ore

## COMPATIBILITATE

Poate fi amestecat cu majoritatea produselor de protecția plantelor; se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate înainte de utilizare.