

STABILAN 750 SL

REGULATOR DE CREȘTERE



Omologat în Republica Moldova cu Certificatul de Omologare
nr. 24-08-08-06-1680 din 08-08-2024

CULTURA:

**GRÂU,
RAPIȚĂ**

CONȚINE:

750 G/L CLORURĂ DE CLORMEQUAT

TIMP DE PAUZĂ:



MOD DE ACȚIUNE:

SISTEMIC



TERMEN DE VALABILITATE:

FORMULARE:

CONCENTRAT SOLUBIL
(SL)



MOD DE ACȚIUNE

Stabilan 750 SL este un regulator de creștere versatil, capabil să producă o gamă largă de modificări fiziologice la diferite specii și varietăți de plante.

- Se absoarbe rapid în plante într-un interval de 2-4 ore, în special în condiții de umiditate ridicată.
- Stabilan 750 SL scurtează și întărește tulpina ceea ce determină prevenirea căderii plantelor.
- Stabilanul 750 SL, aplicat la grâu, produce îngroșarea paiului și scurtarea internodiilor, prevenindu-se astfel căderea plantelor.

Stabilan 750 SL se prezintă sub forma unui lichid limpede, omogen, culoare gălbui deschis, care conține **750 g/l clorură de cloromequat**.

La grâu:

- Reduce procentul de cădere al plantelor;
- Crește eficiența plantei și scade consumul de apă;
- Îmbunătățește consumul de substanțe nutritive.

La rapiță:

- Crește rezistența plantelor la iernare;
- Se mărește sistemul radicular, ceea ce îmbunătățește absorbția de apă și elemente nutritive.



STABILAN® 750 SL

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

În Republica Moldova, este omologat conform tabelului de mai jos:



CULTURA	AGENT PATOGEN	DOZA L/HA	PERIOADĂ DE PAUZĂ / NUMĂR DE TRATĂRI
GRĂU	Retardant (sporește rezistența plantelor la polignire) Prin stropirea semănturilor la sfârșitul fazei de înfrățire a culturii	1,5	- / (1)
RAPIȚĂ	Retardant (sporește rezistența plantelor la îngheț în perioada de iarnă) Prin stropirea semănturilor toamna în faza de 4-6 frunze ale culturii	2	-

*se recomandă aplicarea la soluri intens fertilizate cu azot

TEHNICA DE APLICARE

Grâu

- Doza recomandată pentru o singură utilizare este de 1,5 l/ha.
- Doza mare se va folosi atunci când se întrunesc condiții favorabile pentru căderea grâului.

Se pulverizează prin stropirea semănturilor la sfârșitul fazei de înfrățire a culturii (BBCH 21 – 31, cel mai bun moment BBCH 25)

Rapiță

- Doza recomandată a se aplica este de 2,0 l/ha în faza de 4-6 frunze. Numărul maxim de tratamente în perioada de vegetație: 1

NU UTILIZAȚI SUBSTANȚA

- pe soluri sărace, cu conținut redus de azot;
 - cu 3-4 ore înainte de ploaie sau de îngheț;
 - la temperatura aerului sub 10 ° C sau peste 25 ° C;
 - când există vânt care poate duce substanța pe câmpurile învecinate;
 - pe plante umede;
 - pe culturi cu multe buruieni, în cazul în care nu au fost utilizate substanțe erbicide.
- În timpul aplicării trebuie evitat ca substanța să ajungă pe câmpurile adiacente.

COMPATIBILITATE

- **Stabilan 750 SL** este compatibil cu majoritatea produselor fitosanitare existente pe piață.
- Pentru o mai mare siguranță se va consulta lista de compatibilitate și se va face un test.
- Când se utilizează **Stabilan 750 SL** în combinație cu erbicide, trebuie corelat momentul aplicării cu faza de vegetație.